Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

# TEBUCONAZOLE + PROCLORAZ

**Marcas comerciales**: SUPREME.

**Nomenclatura Química:**
Tebuconazole: Alfa -[2-(4 clrofenil)etil)-alfa( 1-1 dimetiletil)- 1 H -1,2,4triazol-1-etanol
Procloraz: 1-N-propil -N-[2(2,4,6-triclorofenoxi) etil] carbamoil imidazol
**Clasificación Química:** triazol + imidazol.
**Acción:** sistémica, translaminar, preventiva, curativa y erradicante.

**Uso:** fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Cebada | Mancha en red (*Drechslera teres)* | 0.75 - 1 l/ha | 30 | Aplicar a la aparición de los primeros síntomas. |
| Soja | Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mancha marrón (*Septoria glycines hemmi)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachirrhizi sydow)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* | 0.75 l/ha | | Desde R3 hasta R6 cuando se observen los primeros síntomas en la planta. |
| Trigo | Fusariosis (*Fusarium graminearum)* | 1 l/ha | 35 | 30 a 50% de antesis en la espiga, cuando más del 50% de las espigas del lote están en ese estado. |
| | Mancha amarilla (*Pyrenophora tritici repentis)* Roya anaranjada del trigo (*Puccina recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)* | 0.75 - 1 l/ha | | Aplicar según umbrales de daño económico para cada enfermedad. Utilizar las mayores dosis con alta presión de enfermedad y/o variedades susceptibles. |
| | Roya amarilla del trigo (*Puccinia striiformis)* | 0.75 l/ha | | |

**Información General:**

Es un funguicida sistémico, con alta acción translaminar. Posee propiedades preventivas curativas y erradicantes.
Es un funguicida de amplio espectro que combina y sinergiza la acción de sus dos componentes activos brindando la mayor seguridad en el control de los agentes patógenos causantes de las enfermedades. Su mecanismo de acción está basado en la interferencia de la síntesis de los esteroles, componente fundamental de las membranas de los hongos.
Una vez dentro de los cultivos tratados, Supreme se mueve vía xilemática acrópetamente merced al tebuconazole y presenta una gran acción de penetración y de sistemia localizada gracias al Procloraz.
Los mejores resultados se logran aplicando temprano según los umbrales de cada enfermedad.
Puede ser utilizado en los programas de manejo integrado de plagas.

Recomendaciones:
No aplicar cuando los cultivos estén bajo situaciones de stress tales como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas o heladas pues el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
No realizar aplicaciones si se esperan lluvias dentro de las 4 horas de realizado el tratamiento, ya que el control puede no ser el esperado.

Compatibilidad:
Generalmente se usa solo. No mezclar con concentrados emulsionables.

**Derrames:**
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

**Información Toxicológica:**

Del principio activo Tebuconazole:
DL 50 aguda oral en rata: > 4000 mg/kg.
DL 50 dermal en rata: > 5000 mg/kg.

Del principio activo Procloraz
DL 50 aguda oral en rata: 1600 mg/kg.
DL 50 dermal en rata: > 5000 mg/kg.

Del producto formulado:
Débil Sensibilizante Dermal

Riesgos ambientales: Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
No aplicar sobre cursos de agua. No Contaminar fuentes de agua.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPREME | MAGAN ARGENTINA | 33820 | EW | 13,3% + 26,7% | IV |