TETRACONAZOLE

Marcas comerciales: DOMARK 10 – EMERALD 23 ME – LOSPEL

Nomenclatura Química:
tetraconazole: 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)propyl]-1H-1,2,4-triazole).
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: triazol.
Acción: Sistémico, preventiva, curativa y erradicante.

Uso: fungicida

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Antracnosis (*Colletotrichum spp.*) Mancha marrón (*Septoria glycines*) Mancha Púrpura, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii*) Mildiu (*Peronospora manshurica*) Oidio (*Microsphaera difusa*)	PC 10% CE: 500 cm3/ha PC 23% ME: 220 cm3/ha	7	Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) o con la aparición de los primeros síntomas. Repetir 20 días después, según el desarrollo de la enfermedad.
	Roya Asiática (*Phakospsora pachyrhizi*)	PC 10% CE: 500-600 cm3/ha PC 23% ME: 220-260 cm3/ha		
Trigo	Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici*)	PC 10% CE: 1250 cm3/ha PC 23% ME: 540 cm3/ha	35	Aplicar al observar las primeras pústulas. En variedades susceptibles y con condiciones ambientales favorables, se recomienda aplicar preventivamente en encañazón.
	Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis) Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici*)			Aplicar preventivamente en el estadio de embuchamiento. En condiciones de alta presión de la enfermedad, se recomienda mezclar con 1000 cm^3 de clorotalonil al 50%.
	Fusariosis (*Fusarium graminearum*)			Aplicar al inicio de la floración. Para lograr una mejor acción del producto, se recomienda mezclar con 700 cm^3 de carbendazim al 50%.
Maní	Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola*) Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum*)	PC 10% CE: 750 - 1000 cm3/ha PC 23% ME: 325 - 345 cm3/ha		Al observar las primeras manchas foliares de viruela en el cultivo. Las aplicaciones subsiguientes deben hacerse a intervalos de 20 a 28 días, según las condiciones predisponentes a la enfermedad. La dosis más alta y el intervalo de aplicación más corto deberán respetarse cuando existan condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la enfermedad (elevada temperatura y alta humedad ambiente).
Tomate	Tizón temprano (*Alternaria dauci f.sp solani*)	PC 10% CE: 75 – 100 cm3/HL de agua PC 23% ME: 30 – 45 cm3/HL de agua	7	Aplicar ante primeros síntomas, repitiendo de ser necesario cada 7 a 15 días, según condiciones ambientales.
Papa	Tizón temprano (*Alternaria solani*)	PC 10% CE: 750 – 1000 cm3/ha PC 23% ME: 300 – 450 cm3/ha	14	Aplicar ante primeros síntomas, repitiendo de ser necesario cada 15 días, según condiciones ambientales.
Cebolla	Tizón temprano (*Alternaria porri*)		7	
Vid	Oidio (*Oidium tuckeri*)	PC 10% CE: 250 – 300 cm3/ ha	21	1ª- Aplicación: brote de 10 – 15 cm 2ª- Aplicación: pre-floración, 14 días desde la 1ª aplicación (BBCH 53 – 57). 3ª- Aplicación: baya de 6-8 mm, 14 días desde la segunda aplicación (BBCH 71 - 75). Manejo de resistencia: se recomienda no realizar más de 3 aplicaciones en el ciclo del cultivo. En caso de realizar una cuarta aplicación, utilizar un grupo de fungicidas diferente al de los triazoles.

Información General
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Actúa sobre los estados vegetativos del hongo, tanto en el interior como en el exterior de la planta huésped, mediante el bloqueo del crecimiento del micelio. El mecanismo de acción biológico es la inhibición del citocromo P450, bloqueando la biosíntesis del esterol en el hongo. No interfiere en el metabolismo y la fisiología de los vegetales, gracias a la muy alta selectividad bioquímica en el mecanismo de acción fungicida.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado tanto con equipos terrestres como aéreos. En aplicaciones terrestres, usar caudales superiores a 200 litros de agua/ha, con presión de 60-80 libras/pulgada2, 40-70 gotas/cm2 y picos del tipo cono hueco preferentemente. En

aplicaciones aéreas, se recomienda aplicar con un caudal mínimo de agua de 20 l/ha., incorporando 1 litro de aceite coadyuvante para mejorar la aplicación.
Para el cultivo de vid se pueden usar mochilas o equipos de alto caudal. Se debe asegurar un volumen de aplicación de no menos de 800 l/ha.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de reacción neutra. En caso de duda, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa al tratamiento.

Periodo de carencia
Entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir un intervalo mínimo de 35 días en los cultivos de maní y trigo. En soja, cebolla y tomate, 7 días. En papa, 14 días. En vid, 21 días.
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada
48 hs después de aplicado el producto. Corroborar que el producto se haya secado en la superficie de aplicación.

Uso: curasemillas funguicida

Cultivo	Enfermedades	Dosis	Momento de aplicación
Soja	Complejo de hongos de suelo o Dumping off (*Phomopsis spp.; Fusarium spp.; Aspergillus spp.; Penicillum spp.; Rhizopus spp.; Alternaria spp.; Cercospora kikuchii*)	PC 12,5% LS: 120 cm^3 / 100 kg de semilla	Humedecer las semillas sin causar chorreado; usar 0.75 – 1 L de agua / 100 kg de semilla
Trigo	Carbón cubierto o hediondo del trigo (*Tilletia caries y Tilletia.foetida*) Carbón desnudo o volador del trigo (*Ustilago nuda tritici*)	PC 12,5% LS: 80 cm^3 / 100 kg de semilla	
	Fusariosis (*Fusarium graminearum*)		Para lograr una mejor acción del producto, se recomienda mezclar con 100 cm^3 de carbendazim al 50%.

Información General
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Actúa sobre los estados vegetativos del hongo, tanto en el interior como en el exterior de la planta huésped, mediante el bloqueo del crecimiento del micelio. El mecanismo de acción biológico es la inhibición del citocromo P450, bloqueando la biosíntesis del esterol en el hongo. No interfiere en el metabolismo y la fisiología de los vegetales, gracias a la muy alta selectividad bioquímica en el mecanismo de acción fungicida.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación
Se aplica mediante método húmedo o semihúmedo. Es importante utilizar un dispositivo apropiado para la correcta distribución y homogeneización del producto que permita lograr una cobertura uniforme de las semillas. En un tambor rotativo de eje excéntrico, incorporar la mitad de la cantidad de semilla a tratar, luego la dosis indicada del fungicida, diluida en 0.75 a 1 litros de agua por cada 100 kg de semillas, y luego completar el resto de la semilla. Mezclar durante 5 – 10 minutos hasta obtener una homogénea distribución del producto. También puede emplearse una mezcladora tipo hormigonera, máquina mezcladora con sinfín o máquina de tratamiento continuo con picos pulverizadores.
No aplicar directamente dentro de la sembradora.

Compatibilidad
Es compatible con otros terápicos para tratamientos de semillas. Se recomienda realizar una mezcla previa al tratamiento.
Periodo de carencia
NA. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia

Tiempo de reingreso al área tratada
NA.

Derrames
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Contener el derrame evitando la contaminación de canales y superficies de agua. Absorber el producto derramado con un material inerte no combustible (como tierra, arena o arcilla) y transferirlo a contenedores adecuados para su disposición final. Lavar las áreas contaminadas con agua y detergente. No contaminar el medio ambiente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con los ojos, la piel y la boca. Evitar su inhalación. Durante la preparación y aplicación usar guantes y botas de goma, ropa protectora adecuada, máscara, anteojos y protector respiratorio. No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lavar cuidadosamente con jabón y agua abundantes, las partes del cuerpo expuestas al producto.

Información Toxicológica:

Principio activo
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1100 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

Producto formulado 10%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1760 y 2370 mg/kg de peso corporal para rata hembra y macho respectivamente (2070 mg/kg de peso corporal en evaluación combinada para rata hembra y macho)
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 17574 mg/kg de peso corporal (según cálculo propuesto por FAO)
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 5.22 mg/l de aire durante 4 hs para rata

Irritación dermal: Moderamente irritante
Irritación ocular (conejo): Irritante
Sensibilizante dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Producto formulado 12,5%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 4090 y > 5000 mg/kg de peso corporal hembra y macho respectivamente
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 2000 mg/kg de peso corporal.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 3.17 mg/l de aire durante 4 hs para rata (máxima concentración alcanzable)

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular (conejo): Leve irritante
Sensibilizante dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Producto formulado 23%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg de peso corporal para rata hembra
Toxicidad dermal aguda: DL50: > 5000 mg/kg de peso corporal.
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: > 5.0 mg/L de aire durante 4 hs para rata

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular (conejo): No irritante
Sensibilizante dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Moderadamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DOMARK 10	GOWAN ARGENTINA SRL	34166	CE	10%	II
EMERALD 23 ME	GOWAN ARGENTINA SRL	34815	ME	23%	III
LOSPEL	GOWAN ARGENTINA SRL	34165	LS	12,5%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.