CLORANTRANILIPROLE + LAMBDACIALOTRINA

Marcas comerciales: AMPLIGO - CAREXO.

Nomenclatura Química:
clorantraniliprole: 3-bromo-4'-cloro-1-(3-cloro-2-piridil)-2'-metil-6'-(metilcarbamoil) pirazole- 5-carboxanilida
lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del alfa - ciano-3 fenoxibencil-cis-3(Z-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropano carboxilato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: diamidas antranílicas + piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arveja o Alverja	Pulgón azul de la alfalfa *(Acyrthosiphon kondoi*)	50-75 cm3/ha		Aplicar al momento de aparición de los primeros focos.
Colza	Polilla de las coles (*Plutella xylostella)*	100 cm3/ha	50	Aplicar cuando aparezca 1 larva/planta, incidencia menor al 75% de las plantas con presencia de la plaga. Asegurar al menos 20 gotas/cm2 en la parte media de la planta.
Girasol	Oruga medidora (*Rachiplusia nu*)			Aplicar cuando se encuentren 3 a 5 isocas activas/planta.
Maiz	Oruga cortadora o grasienta (*Agrotis spp.)*	75-100 cm3/ha	(*)	En pre-emergencia, aplicar al detectar presencia de la plaga monitoreando debajo de las malezas, en zonas con alto contenido de rastrojo o por medio de cebos tóxicos. En post-emergencia hasta V2 manejar un umbral de 3 orugas cada 100 plantas o 3% de plantas cortadas. Se recomienda la aplicación al atardecer o nocturna para maximizar el contacto con la plaga.
Manzanas	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	20-30 cm3/hl	14	Realizar las aplicaciones de acuerdo al sistema de alarma (carpogrados). Repetir aplicaciones a 21 días. Volumen de aplicación: 2000 L/ha.
	Cochinillas harinosas (*Pseudococcus spp.)*	20 cm3/hl		Aplicar a inicio de migración de ninfas. Volumen de aplicación: 2000 L/ha.
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*	20-30 cm3/hl		Aplicar a inicio de migración de ninfas. Volumen de aplicación: 2000 L/ha.
Peras	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	20-30 cc/hl	7	Realizar las aplicaciones de acuerdo al sistema de alarma (carpogrados). Repetir aplicaciones a 21 días. Volumen de aplicación: 2000 L/ha.
	Cochinillas harinosas (*Pseudococcus spp.)*	20 cm3/hl		Aplicar a inicio de migración de ninfas. Volumen de aplicación: 2000 L/ha.
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*	20-30 cm3/hl		Aplicar a inicio de migración de ninfas.
Soja	Isoca bolillera (*Heliothis spp.)*	50 cm3/ha	15	Aplicar al detectar daño inicial en hojas o vainas en 5% de las plantas y/o 1 oruga/metro de surco.
	Spodoptera (*Spodoptera sp.)*	50 cm3/ha (1)		Aplicar cuando se encuentren 10 larvas mayores a L3 por metro lineal.
	Falsa oruga medidora (*Chrysodeixis includens)*	100 cm3/ha (1)		Aplicar al inicio de ataque al detectar 5 larvas/metro lineal
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	30 - 40 cm3/ha		Aplicar cuando se encuentren 10 larvas pequeñas por metro lineal. Recurrir a la dosis mayor con alta presión de orugas y cuando existe riesgo de reinfestación.
Arandano Frambuesa	Mosca de las alas manchadas *(Drosophila suzukii)*	20 cm3/hl	7	Aplicar de acuerdo a monitoreo y dentro de un programa de manejo de la plaga, alternando con productos de modo de acción diferente. Usar un máximo de dos aplicaciones no consecutivas por temporada con un intervalo entre 7 a 12 días. Usar intervalo menor en condiciones de alta presión de la plaga. Utilizar un volumen de agua que permita el adecuado cubrimiento del cultivo evitando el escurrimiento de la solución al suelo. Para volúmenes menores a 400 Lt/ha respetar la dosis de 200 cc/ha.
Cerezas			10	Aplicar de acuerdo a monitoreo y dentro de un programa de manejo de la plaga, alternando con productos de modo de acción diferente. Usar un máximo de dos aplicaciones no consecutivas por temporada con un intervalo entre 7 a 12 días. Usar intervalo menor en condiciones de alta presión de la plaga. Utilizar un volumen de agua que permita el adecuado cubrimiento del cultivo evitando el escurrimiento de la solución al suelo. Para volúmenes menores a 1000 Lt/ha respetar la dosis de 200 cc/ha.
Vid	Polilla del racimo de la vid (Lobesia botrana)	20-30 cm3/hl Dosis máxima/ha: 300 cm3/ha (*)		Lobesia botrana: Realizar las aplicaciones al momento de iniciar el vuelo de adultos. No aplicar en generaciones sucesivas. No realizar más de 3 aplicaciones por ciclo del cultivo. Residualidad: 28 días

Membrillo	Carpocapsa (Cydia pomonella)	20-30 cm3/hl	7	Realizar las aplicaciones de acuerdo al sistema de alarma (carpogrados). Repetir aplicaciones a 21 días. Volumen de aplicación: 2000 L/ha.
Nuez Pecán	Carpocapsa (*Cydia pomonella*)	20 cm3/hl	13	Aplicar de acuerdo al monitoreo de plagas. Aplicar hasta 2 veces por temporada a un intervalo de 21 días, de acuerdo a la presión de la plaga. Volumen de aplicación: 2000 L/ha. Dosis máxima por aplicación 400 cm3/ha.

(1) Dosis recomendada para PC: Calculate y Carexo
(*) Estimado en base a un volumen de aplicación de 1000 litros/ha

Información General:

Es un insecticida especialmente indicado para el control de Lepidópteros en los cultivos de arveja, girasol, membrillo, maíz, frambuesa, cereza, arándanos, nuez pecán, manzana, pera, soja y colza.
Combina la acción de dos insecticidas, una bisamida y un piretroide, con diferente modo de acción. El clorantraniliprole, perteneciente al grupo de las bisamidas (diamidas antranílicas), interviene en el proceso de contracción muscular de los insectos, actuando como activador de los receptores de ryanodina, activando la liberación de calcio en los músculos y causando regulación desigual en los músculos, parálisis y la muerte del insecto. Por su parte, la lambdacialotrina, es un piretroide fotoestable de nueva generación, que actúa sobre el sistema nervioso del insecto, alterando la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas a los iones sodio, provocando el bloqueo de la conducción de los estímulos nerviosos, y consecuente hiperexcitación, convulsiones, parálisis y finalmente la muerte de los insectos. Presenta actividad ovicida y adulticida, otorgando un amplio espectro de control, especialmente sobre larvas de Lepidópteros.
Formulado como una mezcla de formulaciones (ZC), conteniendo partículas sólidas y microcápsulas en suspensión acuosa estable, conteniendo los principios activos. Dicha estabilidad facilita un mejor mezclado en el tanque de la pulverizadora, permitiendo realizar aplicaciones más eficaces.
Se caracteriza por su buen poder de volteo y persistencia de control, actuando sobre las plagas por contacto e ingestión.

Preparación:
La formulación ZC es una mezcla de formulaciones (suspensión de encapsulado: CS y suspensión concentrada: SC), que contiene en forma estable una suspensión acuosa de microcápsulas y partículas sólidas finas. Esta formulación debe ser diluída en agua para ser aplicada. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Verificar que el equipo de aplicación se encuentre correctamente calibrado. Agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación.
- Agregar la cantidad necesaria de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa. Continuar con la agitación y corroborar la adecuada suspensión del producto.
- Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Utilizar siempre agua limpia. Usar dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo.
Puede aplicarse con equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo 100 l/ha de agua y presión de 2 bar (30 lb/pulg2). En aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de agua de 10 l/ha. No realizar aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición durante la pulverización. Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha de los siguientes cultivos deben transcurrir: Girasol: 30 días; arveja: 30 días; membrillo: 7 días; cereza: 10 días; frambuesa: 7 días; vid: 15 días; nuez pecán: 13 días; manzana: 14 días; pera: 7 días, soja: 15 días y colza 50 días. En el caso del cultivo de girasol, no se establece período de carencia por su uso posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Manejo de resistencia: en cualquier población de insectos pueden existir individuos naturalmente resistentes a otros insecticidas, producto de la variabilidad genética normal. Estos individuos pueden eventualmente tornarse dominantes en la población de insectos, si se usa repetida y reiteradamente este insecticida, reduciendo así sistemáticamente la efectividad de los tratamientos.
La formulación de clorantraniliprole 10% + lambdacialotrina 5%, pertenece al Grupo 28 (diamidas) de la clasificación de modos de acción de insecticidas de IRAC (Comité de Acción sobre Resistencias a Insecticidas). El uso repetido y exclusivo de u otro insecticida del Grupo 28, podría favorecer la selección de los individuos naturalmente resistentes.
Para evitar la generación de biotipos resistentes, deben emplearse las siguientes estrategias de manejo de resistencia:
- Rotar con insecticidas de diferentes modos de acción en ventanas de aplicaciones.
- No realizar más de 2 aplicaciones u otro insecticida del Grupo 28 por ciclo de cultivo (ventana activa). Para el control de la siguiente generación de la plaga controlada, utilizar un producto de diferente modo de acción (ventana inactiva).
- No realizar más del 50 % de las aplicaciones previstas para el ciclo del cultivo con productos que contengan clorantraniliprole u otra bisamida.

El uso de insecticidas debe realizarse en el contexto de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP), contemplando el monitoreo y seguimiento de umbrales, control biológico, técnicas de confusión sexual, etc.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 28 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial/respiratoria y guantes impermeables de acrilonitrilo.

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: = 550 mg/kg.
DL 50 dermal para ratas: > 5000 mg/kg.
LC 50 inhalatoria: >2,97 mg/l (ratas)

Leve irritante dermal (conejo). Moderado irritante ocular (conejo). No sensibilizante dermal (cobayo).
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. Si la cantidad de producto ingerida es considerada menor a la dosis letal, observar al paciente y tratar sintomáticamente. Si se considera necesario un lavaje gástrico, evitar la aspiración del material gástrico. Considerar la administración de carbón activado y un purgante.
Clasificación química: diamida antranílica + piretroide.

Síntomas de intoxicación aguda
No se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Es extremadamente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. Dejar una zona o franja de seguridad entre el área a tratar y fuentes hídricas superficiales. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Considerar una distancia de 30 metros a fuentes de agua.
Es moderadamente tóxico para abejas. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas de arpillera húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Evitar la aplicación de en las horas de mayor actividad de las abejas, realizando las aplicaciones temprano por la mañana o durante la tarde. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas. Considerar una zona buffer de aproximadamente 3 metros a áreas con vegetación nativa. Se debe evitar la aplicación o deriva a zonas de vegetación nativa vecinas
Es prácticamente no tóxico para aves. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
AMPLIGO	SYNGENTA AGRO	36033	ZC	10%+ 5%	II
CAREXO	SYNGENTA AGRO	39830	ZC	10% + 5%	ii

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.