DIFENOCONAZOLE + METALAXIL - M

Marcas comerciales: COMPINCHE (*) - DIVIDEND XTREME.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
Clasificación Química: triazol + acilalanina.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida (terápico para tratamiento de semillas).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Alternaria sp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red (*Drechslera teres)*	100 cm3/100 kg de semilla	(*)	Se debe aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). Según la dosis a utilizar el volumen de dilución es de 1000 cm3/100 kg de semilla. (**) Control Parcial
Trigo	Carbón hediondo o Caries (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago tritici)*			
	Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Fusariosis (*Fusarium graminearum)*	100 - 200 cm3/100 kg de semilla		
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)*	200 cm3/100 kg de semilla		
	Pietín (**) (*Gaeumannomyces graminis)*	300 cm3/100 kg de semilla		

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un fungicida terápico para el tratamiento de semillas de cebada y trigo. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades presentes en el suelo y en las semillas de dichos cultivos. Posee acción sistémica, siendo absorbido por las raíces y traslocado a través de la plántula.
Contiene en su formulación dos principios activos, con modos de acción complementarios. Metalaxil-M, perteneciente a la clase química de las fenilamidas, es un fungicida específico contra Oomycetes. Penetra las raíces y es traslocado en forma sistémica a todas las partes de la planta durante la germinación. Actúa interfiriendo el proceso de síntesis de proteínas. Adicionalmente el difenoconazole, perteneciente al grupo de los triazoles, actúa inhibiendo el desarrollo sub-cuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades. Posee propiedades sistémicas y capacidad traslaminar.
En el cultivo de cebada, controla Mancha en red (Dreschlera teres), Mancha borrosa de la cebada (Bipolaris sorokiniana) y Enfermedades de semillas y suelo (Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillium spp.). En el cultivo de trigo, está especialmente recomendado para el control de Carbón volador (Ustilago tritici), Caries o Carbón hediondo (Tilletia caries), Fusariosis (Fusarium graminearum), Mancha amarilla (Drechslera tritici-repentis), y Damping off (Pythium spp.; Rhizoctonia spp.) y provee control parcial de Pietín (Gaeumannomyces graminis).
No afecta el poder germinativo de las semillas de cebada o trigo, permitiendo su normal desarrollo.

Preparación
Se debe aplicar sobre las semillas en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente de producto sobre agua limpia en cantidad necesaria hasta alcanzar un volumen de 1 litro de caldo cada 100 kg de semillas. Según la dosis a utilizar, la dilución deberá prepararse en las siguientes proporciones:

Cebada:
- 100 cm3+ 900 cm3 de agua

Trigo:
-100 cm3 + 900 cm3 de agua
-200 cm3 + 800 cm3 de agua
-300 cm3 + 700 cm3 de agua

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
-Agregar luego la cantidad necesaria según la cantidad de semillas a tratar. Mezclar bien y verificar la adecuada dilución del producto.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.

-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Suspensión concentrada para ser aplicada sobre las semillas de cebada y trigo. Para obtener una buena protección del cultivo, es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando que cada semilla quede cubierta en forma uniforme.
El tratamiento en cebada o trigo se puede realizar con tambor rotativo de eje excéntrico, mezcladora tipo hormigonera, máquina mezcladora con sinfín o máquinas de tratamiento continuo con picos pulverizadores. No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la misma fluirá más lentamente.

Período de carencia
Exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece al grupo 3 y grupo 4 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad
Puede mezclarse con otros terápicos para tratamientos de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos

Fitotoxicidad
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos de trigo o cebada, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): G1:3 (FRAC) + A1:4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, sombrero o casco, botas de goma, protección facial y anteojos de seguridad. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5050 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo):	DL50: > 5050 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: >2,73 mg/m3
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante dermal

Primeros auxilios

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Ligeramente tóxico

Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de animales y abejas

Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales.

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
COMPINCHE (*)	SYNGENTA AGRO	35700	FS	9,2% + 2,3%	IV
DIVIDEND XTREME	SYNGENTA AGRO	35532	FS	9,2% + 2,3%	IV

(*) Distribuido por RIZOBACTER ARGENTINA S.A.