METOMINOSTROBIN + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: RACE RM.

Nomenclatura Química:
metominostrobin: (E)-2-(metoximino)-N- metil-2-(2-fenoxifenil) acetamida
tebuconazole: alfa-[2-(4-chlorofenil)etil]-alfa-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante.

Uso: fungicida (foliar).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada del trigo (*Puccinia recondita f. sp. tritici)*	500 a 600 cm3ha (*)	35	Aplicar desde el estadio de hoja bandera enrollada (Z.3.7) a hoja bandera desplegada (Z.3.9) cuando se registren síntomas (pústulas y/o manchas en la hoja bandera menos 2 (HB-2). Utilizar las dosis altas en el sudeste de Bs As donde el llenado de grano es más prolongado y se busque mayor residualidad del tratamiento.
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*	300 cm3/ha (*)	40	Aplicar desde R3 hasta R6 cuando se observen presencia de síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Aplicar el producto de forma preventiva cuando las condiciones sean predisponentes para la enfermedad, o al detectarse los primeros síntomas de la enfermedad. En caso de que las condiciones sigan siendo favorables y se detecten nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación.
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)* Tizón (*Helminthosporium turcicum)*	500 a 600 cm3/ha (*)	60	La aplicación debe ser realizada ante la presencia de las primeras pústulas a partir del estadio vegetativo V8 (octava hoja totalmente expandida) - V10. Utilizar la dosis mayor ante alta presión de la enfermedad y condiciones ambientales predisponentes para el desarrollo de la misma.
Papa	Tizón Temprano de la papa (*Alternaria solani*)	400(*)	30	Realizar las aplicaciones al observar primeros síntomas en hojas inferiores. Repetir el tratamiento cada 10-14 días de acuerdo a la evolución de las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. No realizar más de 3 aplicaciones por ciclo de cultivo.

(*) Aplicar con 500 cm3/ha de coadyuvante a base de esteres metílicos de aceite de soja. Mejora la llegada y distribución del producto en el cultivo y la penetración de los activos en las hojas. En el caso de aguas duras, usar corrector, ya que la eficacia se ve afectada y puede producirse precipitado.

Información General:

Modo de acción:
Metominostrobin es un fungicida de acción preventiva, curativa, erradicante y antiesporulante, perteneciente al grupo de los metoxiacrilatos o comúnmente denominados como estrobilurinas. Actúa inhibiendo el proceso de respiración celular de los hongos, lo que determina que sea particularmente efectivo en impedir la germinación de las esporas y el crecimiento inicial del micelio en la superficie de los vegetales. El tebuconazole pertenece a la familia de los triazoles, es de acción sistémica. Tiene acción curativa y erradicante.

Preparación: llenar el tanque de la maquina pulverizadora hasta la mitad con agua, agregar la cantidad necesaria del producto (previamente agitando el envase) completar el faltante del tanque con agua, mantener en funcionamiento el sistema de agitación. Equipo y volumen de aplicación: puede aplicarse con equipos terrestres o aéreos, utilizando un volumen mínimo de agua de 150 litros/ha y una presión superior a 40 lb/pulg2, siguiendo los siguientes parámetros en cuanto a calidad de aplicación: cobertura; 30 a 40 gotas/cm2, tamaño de gota; 200 a 400 micrones, uniformidad; 20% de coeficiente de variación.

Restricciones de uso: tiempo de reingreso al área tratada 24 horas.

Recomendaciones de uso: no presenta condiciones especiales de uso más que las indicadas: Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor a 30°C, humedad relativa menor a 40%, viento mayor a 15 km/hora. Agregar coadyuvante a base de esteres metílicos de aceite de soja (500 cm3) para mejorar la llegada y distribución del producto en el cultivo y la penetración de los activos en las hojas.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos comúnmente usados en los cultivos de soja. No mezclar con productos alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad de cualquier mezcla que se intente realizar.

Fitotoxicidad: No se observan casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar máscara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: 200 - 2000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda: > 4.000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria: >2,15 mg/l.

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico en aves y peces, por lo que se recomienda no aplicar en fuentes de agua natural o artificial. Dejar una distancia entre la aplicación y el curso de agua de 3 metros. Ligeramente tóxico para abejas. Dar aviso a los apicultores antes de aplicar.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RACE RM	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	36452	SC	15% + 30%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.