IMAZAMOX + IMAZAPIR

Marcas comerciales: CLEARSOL PLUS - CLEARSOL II PLUS PACK.

Nomenclatura Química:
imazamox: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-imidazolin-2-ilo)-5-(metoximetil) nicotínico
imazapir: ácido 2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il) nicotínico
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: imidazolinona + imidazolinona.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida ((post-emergencia) Clearsol II Plus Pack).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol CL Plus	Abrojo chico (*Xanthium spinosum*) Quinoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album*)	100g/ha + Trigosol: 29g/ha (Control)		Hasta 4ª hoja verdadera.
	Cardo ruso (*Salsola Kali*) Chinchilla (*Tagetes minuta*)	Clearsol DF : 80g/ha + Trigosol: 23g/ha (Control / Parcial) (*)		Hasta 2ª hoja verdadera.
	Capin Arroz (*Echinochloa crus-galli*) Pasto cuaresma (*Digitaria sanguinalis*) Roseta (*Cenchrus pausiflorus*)	Clearsol DF : 60g/ha + Trigosol: 17g/ha (Supresión)		Hasta 3ª hoja.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)*			Entre 3ª y 7ª hoja.
	Rama negra (*Conyza sumatrensis*)			Hasta 10 cm de roseta.

Referencia: Control: >85%. Parcial: 80-85%. Supresión: 50-80%.

(*)
Control:
Quinoa (Chenopodium album), Abrojo chico (Xanthium espinosum), Chinchilla (Tagetes minuta), Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis), Roseta (Cenchrus pausiflorus.
Parcial:
Cardo ruso (Salsola Kali), Capin Arroz (Echinochloa crus-galli), Cebollín (Cyperus rotundus), Rama negra (Conyza sumatrensis)

REQUERIMIENTOS:

1) Clearsol DF: 100g/ha + Trigosol: 29g/ha:

Tiempo: Sin restricciones a rotación
Precipitaciones (#): … // %MO: … // Arena: …
Cultivos de Rotación / Resiembra: Maíz CL, Girasol CL y CL Plus, Trigo CL

Tiempo: 3 meses
Precipitaciones (#): 300 mm // %MO: Todos los suelos // Arena: …
Cultivos de Rotación / Resiembra: Soja, Maní, Arveja, Lenteja, Poroto, Alfalfa, Trébol Rojo y Blanco, Avena, Trigo Pan, Cebada, Trébol de Olor Blanco, Trébol de Olor Amarillo, Pasto Ovillo, Cebadilla Criolla, Festuca, Raigrás.

2) Clearsol DF: Clearsol DF: 80g/ha + Trigosol: 23g/ha:

Tiempo: Sin restricciones a rotación
Precipitaciones (#): … // %MO: … // Arena: …
Cultivos de Rotación / Resiembra: Maíz CL, Girasol CL y CL Plus, Trigo CL

Tiempo: 3 meses
Precipitaciones (#): 300 mm // %MO: <2% // Arena: >70%
Cultivos de Rotación / Resiembra: Soja, Maní, Arveja, Lenteja, Poroto, Alfalfa, Trébol Rojo y Blanco, Avena, Trigo Pan, Cebada, Trébol de Olor Blanco, Trébol de Olor Amarillo, Pasto Ovillo, Centeno, Cebadilla Criolla, Festuca, Raigrás.

Tiempo: 3 meses
Precipitaciones (#): 200 mm // %MO: >2% // Arena: <70%
Cultivos de Rotación / Resiembra: Soja, Maní, Arveja, Lenteja, Poroto, Alfalfa, Trébol Rojo y Blanco, Avena, Trigo Pan, Cebada, Trébol de Olor Blanco, Trébol de Olor Amarillo, Pasto Ovillo, Centeno, Cebadilla Criolla, Festuca, Raigrás.

Tiempo: 5 meses
Precipitaciones (#): 300 mm // %MO: <2% // Arena: >70%
Cultivos de Rotación / Resiembra: Maiz.

3) Clearsol DF: Clearsol DF: 60g/ha + Trigosol : 17g/ha:

Tiempo: Sin restricciones a rotación
Precipitaciones (#): 150 mm // %MO: Todos los suelos // Arena: …

Cultivos de Rotación / Resiembra: Maíz CL, Girasol CL y CL Plus, Trigo CL, Soja.

Tiempo: 5 meses
Precipitaciones (#): 150 mm // %MO: Todos los suelos // Arena: …
Cultivos de Rotación / Resiembra: Avena, Maiz, Arroz.

Tiempo: 5 meses
Precipitaciones (#): 150 mm // %MO: Todos los suelos // Arena: …
Cultivos de Rotación / Resiembra: Maní, Arveja, Lenteja, Poroto, Alfalfa, Trébol Rojo y Blanco, Trigo Pan, Cebada, Trébol de Olor Blanco, Trébol de Olor Amarillo, Pasto Ovillo, Centeno, Cebadilla Criolla, Festuca, Raigrás.

(#) Precipitaciones acumuladas en lluvias mayores a 20 mm cada una, durante los meses posteriores a la aplicación. Con una distribución de lluvia del 30% en los primeros 60 días post aplicación.

Uso: herbicida (post-emergencia) Clearsol Plus).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol Clearfield	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Nabo (*Brassica campestris)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*	1,5 - 2 l/ha (***)		Hasta 4ª hoja verdadera.
	Amor seco (*Bidens pilosa)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Tutía (*Solanum sisymbrifolium)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			Hasta 2ª hoja verdadera.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Colas de zorro (*Setaria verticilata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			Hasta 3ª hoja.
	Cebollín (*) (*Cyperus rotundus)* Chufa (*) (*Cyperus esculentus)*	2 l/ha		Entre 3ª y 7ª hoja.
	Gramón (**) (*Cynodon dactylon)*			Estolones de 5 - 10 cm.
	Roseta (*) (*Cenchrus pauciflorus)*			Hasta 3ª hoja.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*) (*Sorghum halepense)*			Hasta 30 cm de altura.
	Yuyo esqueleto (*) (*Chondrilla juncea)*			Hasta 4ª hoja verdadera.

(*) Control parcial.
(**) Reducción de la incidencia.
(***) 1,5 litros por hectárea: dosis recomendada para lotes con baja infestación de malezas (menos de 10 plantas/m2)
2 litros por hectárea: dosis recomendada para lotes con mediana a alta infestación de malezas, o con presencia importante de malezas perennes.

Información General:

Es un herbicida sistémico, selectivo, post-emergente, con efecto prolongado, para el control de malezas en híbridos de Girasol CL Plus, identificados en la etiqueta de la bolsa de semilla con el logo Clearfield® Plus. Este herbicida es absorbido por el follaje y las raíces y transportado dentro de la planta a los meristemas de crecimiento donde ejerce su acción herbicida. El producto es absorbido por las raíces en menor medida que por las hojas. Luego de la aplicación del producto, las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejan de competir con el cultivo y mueren dentro de las 2 a 4 semanas posteriores a la aplicación. Para el control de las malezas susceptibles que germinen después de la aplicación del producto es necesaria una lluvia que incorpore el producto en el suelo. Ocasionalmente, el cultivo de Girasol CL Plus tratado con este producto puede mostrar un ligero amarillamiento de las hojas y/o un leve acortamiento de los entrenudos; estos síntomas desaparecen en poco tiempo, no afectando los rendimientos. Como una práctica general de manejo de resistencia de malezas a herbicidas, este producto y otros

productos con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a, otros productos registrados con modos de acción diferentes.

ADVERTENCIA: imazamox + imazapir solo puede ser utilizado en híbridos de girasol identificados con el logotipo Clearfield® Plus o CL Plus; su uso en híbridos de Girasol Clearfield® no identificados como Plus, ó en híbridos No Clearfield® puede causar severos daños al cultivo. No debe utilizarse imazamox+imazapir en forma distinta a la indicada en su marbete.

Instrucciones de uso:
Preparación de la solución: llenar el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, agregue la cantidad recomendada del producto al tanque del pulverizador. Completar con agua limpia. No dejar el caldo preparado de un día para otro. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales vigentes.

IMPORTANTE: para evitar posibles daños a cultivos sensibles, se recomienda limpiar cuidadosamente el equipo de aplicación luego de su utilización con el producto.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres: debe aplicarse con pulverizadores equipados con un botalón con picos provistos de pastillas de abanico plano ó doble abanico. La presión de aspersión debe ser de 2,1 a 3,2 kg/cm2 (30-45 lb/pulg2). El volumen de aplicación debe ser de 100 a 150 litros de agua/ha, procurando un promedio de 30 gotas/cm2. Asperjar sólo cuando las condiciones de humedad favorezcan el activo crecimiento de las malezas y el viento no cause deriva excesiva. Evitar que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación.
Aplicación aérea: no está recomendada.

Recomendaciones de uso
El producto debe ser aplicado en post-emergencia temprana del cultivo de Girasol CL Plus, desde el momento de la emergencia de las malezas hasta el estado de desarrollo indicado en el cuadro de uso.
- No aplicar el producto luego del estado de botón floral del cultivo de Girasol CL Plus.
- No aplicar el producto sobre malezas en estado de desarrollo mayor al recomendado.
- Hasta no disponer de mayor información, recomendamos no utilizar insecticidas órgano fosforados en tratamiento de semillas, ni en mezcla de tanque con el producto o en aplicaciones al suelo.
- Este herbicida debe ser utilizado dentro de un programa integral de manejo del cultivo de girasol que incluya fertilizantes en aquellos casos en que los lotes a utilizar no sean de buena fertilidad, y un adecuado control de las principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo.
- Utilizar semilla de buen Vigor y Poder Germinativo

Restricciones de uso:
Uso posicionado. En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
- No aplicar el producto en aquellos lotes tratados previamente durante el barbecho con sulfonilureas, imidazolinonas o sulfonamidas.
- No aplicar imazamox + imazapir en cultivos de Girasol Clearfield® Plus sometidos a estrés hídrico o térmico (sequía prolongada, heladas intensas, anegamiento).

Cultivos de rotación: hasta disponer de mayor información, sólo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos, siguiendo al cultivo de Girasol CL Plus (Clearfield® Plus) tratado con imazamox+imazapir.
A) sin restricciones: alfalfa, arveja, lenteja, maní, poroto, soja, tréboles, trébol de olor blanco, trébol de olor amarillo, Girasol Clearfield®, Maíz Clearfield®, Colza Clearfield®
B) tres meses luego de la aplicación de imazamox + imazapir: cebada, centeno, trigo.
C) cinco meses luego de la aplicación de imazamox + imazapir: arroz, avena y maíz.

Compatibilidad: consultar con un representante de la empresa proveedora antes de mezclar el producto con otros productos no mencionados en las Recomendaciones de Uso.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas, depósitos abiertos de agua o cursos de agua. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, botas de goma, protección facial, camisa de manga larga y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Del formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: > 6,18 mg/l 4 h

Irritación dermal:	No irritante. // Leve irritante dermal (*)
Irritación ocular:	Ligeramente irritante // Moderado irritante ocular (*)
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

(*) Clearsol II Plus Pack

Primeros auxilios
En caso de ingestión: beber gran cantidad de agua. Inducir el vómito, tocando la garganta con los dedos.
En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua. Visitar al médico si la irritación persiste.
En caso de contacto con la piel: lavarla con agua y jabón. Visitar al médico si ocurre irritación.
En caso de inhalación: si la exposición es excesiva remover al aire fresco
Consultar al médico en todos los casos.

Riesgos ambientales:
Producto prácticamente no tóxico para aves, ligeramente tóxico para peces y virtualmente no tóxico para abejas. // Ligeramente tóxico para abejas. Evitar aplicaciones en el horario de pecoreo de las abejas. Proteger los colmenares cerrando piqueras o trasladándolas a lugares seguros. (*)
No contaminar cursos ni fuentes de agua.

(*) Clearsol II Plus Pack

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CLEARSOL PLUS	BASF ARGENTINA	36458	SL	3,5% + 1,6%	IV
CLEARSOL II PLUS PACK	BASF ARGENTINA	PACK (35973 + 34908)	WG	70% + 80%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.