METCONAZOLE + EPOXICONAZOLE

Marcas comerciales: DUETT PLUS.

Nomenclatura Química:
metconazole: 1 RS, 5 RS: 1 RS, 5 RS)-5- (4-clorobencil)-2,2 dimetil-1- (1H- 1,2,4-triazol-1-Imetil) ciclopentanol
epoxiconazole: (2RS, 3SR)-3-(2 clorofenil)-2-(4-fluorofenil) -2-[(1H-1,2,4,-triazol-1-y1) metil] oxirane
Clasificación Química: triazol + triazol.
Acción: sistémica y residual.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Fusariosis de la espiga (*Fusarium graminearum)*	1,5 l/ha	50	El tratamiento es netamente preventivo, aplicar desde comienzo de antesis (anteras expuestas). El asperjado del producto debe tener como blanco el centro de la espiga, el blanco de la gota es el filamento de la antera.
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	1 - 1,2 l/ha		Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o en Zadoks 39 en forma preventiva. Con variedades susceptibles o alta presión de la enfermedad se recomienda utilizar la dosis máxima.
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja (*Puccinia recondita)*		60	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas o en Zadoks 37 en forma preventiva. Con variedades susceptibles o alta presión de la enfermedad se recomienda utilizar la dosis máxima.
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura (*Cercospora kikuchi)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	0,8 l/ha	45	Aplicar a primeros síntomas o preventivamente en R 3 (inicio de formación de vainas).
Maní	Viruela tardía del maní (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	1 l/ha		Iniciar los tratamientos a la aparición de los primeros síntomas. Hacer aplicaciones subsiguientes con intervalos de 14-21 días. Repetir las aplicaciones en el intervalo más corto indicado cuando existan condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades como: elevada humedad ambiente, lluvias y elevada temperatura.

Información General:

Es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en el cultivo de trigo y cebada, fusariosis de la espiga de trigo, enfermedades de fin de ciclo y roya asiática en el cultivo de soja y las viruelas en el cultivo de maní. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicante sobre las hojas expuestas en el momento de la aplicación. La base del control del producto está en la sinergia que se produce al mezclar epoxiconazole con metconazole. Estos dos triazoles pertenecen a la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica, de larga residualidad. Esta mezcla tiene una sistemia acropétala (de abajo hacia arriba).

Preparación:
Importante: agitar bien el envase del producto antes de usar. El mismo debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua (utilizar siempre agua limpia.) hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego agregar el producto con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo. Aplicaciones terrestres: se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg.2 No utilizar volúmenes inferiores a 200 l/ha. En aplicaciones para fusariosis de la espiga se deben lograr 60-80 gotas/cm2. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Aplicaciones aéreas: El volumen no deberá ser inferior a 15 l/ha. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Restricciones: Evitar la deriva en aplicaciones del producto sobre cultivos susceptibles como: frutales, hortalizas y viñedos.

Advertencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a los fungicidas, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Ver clasificación.

Como una práctica general de manejo de resistencia de enfermedades a fungicidas, este producto y otros productos con el mismo modo de acción deberían ser aplicados en combinación con, o secuencialmente a, otros productos registrados con modos de acción diferentes. La rotación de cultivos es también una práctica aconsejable. Sugerimos contactar al representante de la empresa proveedora para información adicional. En el caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No aplicar sobre fuentes de agua.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5.000 mg/kg
Inhalación (rata):	CL 50: 5,45 mg/l
Irritación dermal:	No irritante.
Irritación ocular:	No irritante.
Sensibilización dermal:	Sensibilizante dermal.

Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico. Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. Prácticamente no tóxico, después de una única inhalación. No es irritante para los ojos. No es irritante para la piel. Posible sensibilización tras el contacto con la piel.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DUETT PLUS	BASF ARGENTINA	36386	EC	2,75% + 3,75%	III