TIACLOPRID + DELTAMETRINA

Marcas comerciales: PROTEUS.

Nomenclatura Química:
tiacloprid: N-{3-[(6-Cloro-3-piridinil)metil]-1,3-tiazolan-2-iliden} cianamida.
deltametrina: isómero d-cis de alfa-ciano 3(fenoxibencil-2,2 dimetil-[2,2 dibromovinil] ciclopropano carboxilato
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Tomate	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca (*Trialeurodes vaporariorum)*	200 cm3/hl	2	Aplicar en aspersión foliar al aparecer la plaga logrando un mojado completo de las plantas. Repetir las aplicaciones cada 10 días.

Información General:

Es un producto compuesto por los ingredientes activos tiacloprid y deltametrina. Es un efectivo insecticida, que combina la acción por contacto e ingestión de ambos, con las buenas características sistémicas del tiacloprid. Tiene un adecuado poder residual, ya que la deltametrina es estable a la luz solar, además de no lavarse con el agua de lluvia ni de riego.
El tiacloprid actúa excitando ciertas células nerviosas por su acción sobre los receptores proteicos, mientras que la deltametrina actúa inhibiendo el funcionamiento de la bomba de Na-K de la membrana de las mismas. En contraste con la acetilcolinesterasa, tiacloprid no puede, o sólo parcialmente, ser desactivado. El efecto último que se produce es un desorden nervioso que lleva a la muerte del insecto blanco.

Preparación:
Agitar enérgicamente antes de usar. Como práctica general para productos formulados como suspensión concentrada, se debe hacer una dispersión de la dosis a aplicar en un caudal aproximado de 5 litros de agua para posteriormente incorporar esta pre-dispersión en el tanque del equipo de aplicación.

Equipo de aplicación: puede ser aplicado con mochilas manuales o a motor y máquina a manguera o turbina en aspersión directamente al follaje. El volumen de aplicación no deberá ser inferior a 600 litros de agua por hectárea, ajustando el mismo de acuerdo a desarrollo del cultivo con el fin de lograr el correcto mojado de las plantas.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL50 oral aguda: 1000 mg/kg (rata macho y hembra)
DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata macho y hembra)
CL50 inhalatoria aguda: > 4793 mg/m3 (rata macho y hembra)

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: muy tóxico. No obstante esto y, en virtud de las evaluaciones de riesgo realizadas convenientemente; no se esperan daños al ambiente acuático si el producto es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas en la etiqueta. No obstante, se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.

PROTEUS	BAYER	35053	OD	10% + 1%	II