BIFENTRIN + IMIDACLOPRID

Marcas comerciales: ADAMA GALIL - CONCLUSION - ENERGY - KHOSPI - MAGIC.

Nomenclatura Química:
bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil) 2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)- N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina
Clasificación Química: piretroide + neonicotinoide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	PC 3% + 10%: 300 cm3/ha	30	Aplicar con 5 orugas mayores de 2 cm y hasta 10 orugas menores de 2 cm, preferentemente antes del cierre de surco. Ajustar teniendo en cuenta el estado fenológico, condición hídrica, espaciamiento entre hileras y grupo de madurez.
	Arañuelas (*Tetranychus spp.)*	PC 3% + 10%: 500 cm3 /ha + 1 l/ha de aceite mineral		Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se detecte el inicio de la infestación con menos de 15 arañuelas por folíolo en al menos el 30 % de las hojas. En sojas bajo condiciones de estrés en etapas vegetativas tempranas aplicar ante la sola presencia.
	Trips negro o Trips del poroto (*Calliothrips phaseoli)*	PC 3% + 10%: 500 cm3/ha		Aplicar cuando en el tercio medio del cultivo se observan 5 ninfas por folíolo. En sojas bajo condiciones de estrés aplicar ante la sola presencia de ninfas en el tercio medio.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*	PC 3% + 10%: 600 cm3/ha		1 chinche cada 3 m lineales(*) (**)Seguir las recomendaciones de umbral de daño, según los estados fenológicos, indicados a continuación: Nivel de decisión para el control de chinches en soja según especies y estados fenológicos (distanciamiento a 52 cm): R3-R4 Formac. de vainas Chinche verde: 0,6 - 0,7 / m Chinche de la alfalfa: 0,4 - 0,5 / m R5 Formac. de granos Chinche verde: 1,5 / m Chinche de la alfalfa: 0,7 / m R6-7 (1) Después grano lleno Chinche verde: 5,5 / m Chinche de la alfalfa: 3 / m
	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)* Chinche espinosa (*Dichelops furcatus)*	PC 5% + 25%: 250 cm3/ha		Aplicar cuando se encuentre 1 chinche/m2.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*			
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*			Aplicar al llegar al umbral de 10 orugas menores a L3/m2.
	Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*			
	Picudo negro de la vaina (*Rhyssomatus subtilis)*			Comenzar la aplicación al observar 2 adultos/m2.
	Trips (*Caliothrips phaseoli)*			Aplicar con un promedio de 5 ninfas/foliolo.
	Tucuras (*Dichroplus spp.)*			Aplicar con promedio 2 tucuras chicas/m2.

(*) Recomendación de FMC. Muestreo con paño vertical. Distancia entre hileras: 0,52 m. Evitar monitoreo en horas de mayor temperatura e insolación

Información General:

Es un insecticida que combina la acción de un piretroide y un neonicotinoide actuando por contacto, ingestión y vía sistémica en el control de insectos interviniendo en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central. Combina la doble acción de sus principios activos. El bifentrin es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola.
El otro activo, el imidacloprid, es un insecticida del grupo de las nitroguanidinas que interfiere la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos.

Se combina el efecto de volteo del bifentrín y el efecto prolongado o residual del imidacloprid.

Instrucciones para el uso

Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, agregue la cantidad requerida de producto y complete el volumen de agua. Mantener los agitadores en funcionamiento durante la preparación y aplicación.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: para la aplicación emplear equipos de aspersión perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear volúmenes no inferiores a 10 l/ha, cuando se utilice como vehículo agua. Para un mejor control, se recomienda una cobertura de 50-70 gotas/cm2 de superficie foliar.

Compatibilidad: es compatible con los fitosanitarios de uso corriente, excepto aquellos de reacción alcalina. De cualquier modo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa antes de usar cualquier mezcla.

Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir 30 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: una vez que la neblina de aplicación se haya depositado completamente sobre el cultivo. Utilizar ropas protectoras adecuadas.

Fitotoxicidad: no fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

Derrames:
Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y adsorber el derrame con material adsorbente (arena, tierra, arcilla).Lavar el área con detergente industrial fuerte y adsorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el adsorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (IRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Medidas de precaución personal: evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 3%+10%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 0,89 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Del producto formulado 5%+25%:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 300 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 1,96 mg/l (NOCIVO)
Irritación ocular:	Leve irritante (CUIDADO)
Sensibilización dermal:	Leve sensibilizante (CUIDADO)

Primeros auxilios: en caso de inhalación, llevar a la persona afectada hacia el aire fresco y procurar atención médica si se presentan síntomas de intoxicación. Si hay contacto con la piel lavar cuidadosamente con abundante agua y jabón. Si aparece irritación persistente realizar una consulta médica. Si entra en contacto con los ojos lavar con agua durante un mínimo de 15 minutos a párpado abierto. En caso de ingestión, procurar asistencia médica de inmediato.

Advertencia para el médico: Producto ligeramente peligroso (Clase III). Aplicar tratamiento sintomático y de recuperación. Nocivo por vía inhalatoria (Clase II)

Tratamiento sintomático y dar terapia de soporte. No hay antídoto específico.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico (*) (**)
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico (*) (**)
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico (*)/Muy tóxico (**)

(*) del producto 3%+10%
(**) del producto 5%+25%

Peces: Producto moderadamente a muy tóxico según concentración, por lo que se recomienda dejar una franja de seguridad de 50 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. No contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de pulverizaciones, limpiezas de equipos ni envases de fitosanitarios en acequias o ríos.
Abejas: Altamente tóxico. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladárselas, tapar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana temprano o al atardecer fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA GALIL	ADAMA ARGENTINA SA	35970	SC	5% + 25%	II
CONCLUSION	FMC	40444	SC	3% + 10%	III
ENERGY	INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.	38314	SC	3% + 10%	II
KOSPI	ROTAM	38393	SC	3% + 10%	III
MAGIC	FMC	36119	SC	3% + 10%	III