ETIPROLE + FIPRONIL

Marcas comerciales: REGENT ET PACK.

Nomenclatura Química:
Parte 1: etiprole: 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometIl)fenil]-4-(etilsulfinil)-1/-/-pirazol-3-carbonitrilo
Parte 2: fipronil: (+-)-5-amino-1-(2,6-dicloro-alfa-alfa-alfa-trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometil sulfinil-pirazol-3-carbonitrilo
Clasificación Química: fenilpirazol + fenilpirazol.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: curasemillas insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Picudo de la soja (*Sternechus pinguis)* Picudo de la soja (*Promecops carinicollis)* Picudo negro (*Rhissomatus subtilis)*	125 - 150 cm3 de Parte 1 + 125 - 150 cm3 de Parte 2 /100 kg de semillas		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.

Información General:

Es un producto insecticida tipo Twin Pack para el tratamiento de semillas. Está formulado a base de los principios activos etiprole y fipronil.
Su principio activo etiprole actúa sobre el sistema nervioso central de la plaga, provocando su muerte. El método de acción del principio activo difiere de la mayoría de las familias insecticidas (piretroides, organofosforados, carbamatos, metilnicotínicos, etc.), motivo por el cual se disminuye la probabilidad de que las plagas se vuelvan resistentes a dicho principio activo.
El principio activo fipronil corresponde al grupo de los fenil pirazoles. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de los insectos.
Ambos principios activos combinan su acción para controlar al Picudo chico de la soja y al Picudo grande de la soja.

Preparación:
La semilla a tratar, previamente ventilada para eliminar todo resto de residuos orgánicos, polvo, etc; debe tener buena energía y poder germinativo. Se deben evitar las sub-dosificaciones.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo.
Aplicar la dosis recomendada de parte 1 y de la parte 2 diluidas hasta llegar a un volumen de caldo total de 400 ml/ 100 kilos de semillas. Realizado esto y con el equipo en movimiento, volcar el caldo dentro del mismo hasta que se observe el buen recubrimiento de toda la semilla.

Compatibilidad:
No se conoce incompatibilidad alguna. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de formulaciones con otros productos, se compruebe su compatibilidad física al mezclarlos en un recipiente pequeño.

Fitotoxicidad:
No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (IRAC) + 2 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar durante la aplicación botas, protección respiratoria, guantes y ropa protectora adecuada. Después de la aplicación lavarse todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto con abundante agua y jabón.

Información Toxicológica:

De los productos formulados (etiprole+fipronil)

	Curbix 35 FS(etiprole 35%)	Regent 25 FS(fipronil 25%)
Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 1000 mg/kg	DL50: 1087 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: > 2990 mg/l	CL50: 0,64 ml/l

Irritación dermal:	No irritante	No irritante
Irritación ocular:	No irritante	No irritante
Sensibilización dermal:	Potencial sensibilizante	Potencial sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Altamente tóxico, aunque no se espera exposición del producto a las abejas por tratarse de un terápico para tratamiento de semillas.
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico para aves. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Toxicidad para peces y organismos acuáticos: Extremadamente tóxico. No se esperan daños al ambiente acuático si el producto es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de uso indicadas en esta etiqueta. No obstante, se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
REGENT ET PACK	BAYER	Pack 98	FS	35% y 25%	II