ETIPROLE

Marcas comerciales: CURBIX 35 FS.

Nomenclatura Química:
etiprole: 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometIl)fenil]-4-(etilsulfinil)-1/-/-pirazol-3-carbonitrilo
Clasificación Química: fenilpirazol.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: curasemillas (al 35%).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Picudo chico de la soja (*Promecops carinicollis)* Picudo grande de la soja (*Sternechus pinguis)*	125 - 150 cm3/100 kg de semillas *		La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra.
	Gorgojo de suelo *(Pantomorus spp.)*	100 – 150 cm 3 /100 kg de semillas **		

(*) aplicar junto con fipronil 25% a dosis de 125-150 ml/100 kg de semillas.
(**) aplicar junto con fipronil 25% a dosis de 100-150 ml/100 kg de semillas.

Información General:

Etiprole 35% es un producto insecticida para el tratamiento de semillas. Actúa sobre el sistema nervioso central de la plaga, provocando su muerte. El método de acción del principio activo difiere de la mayoría de las familias insecticidas (piretroides, organofosforados, carbamatos, metilnicotínicos, etc.), lo cual disminuye la probabilidad de que las plagas se vuelvan resistentes al etiprole.

Preparación:
La semilla a tratar, previamente ventilada para eliminar todo resto de residuos orgánicos, polvo, etc; debe tener buena energía y poder germinativo. Se deben evitar las sub-dosificaciones.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Etiprole está dentro de un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo.
Aplicar la dosis recomendada de etiprole 35% y fipronil 25% diluida hasta llegar a un volumen de caldo total de 400 ml/100 kilos de semillas. Realizado esto y con el equipo en movimiento, volcar el caldo dentro del mismo hasta que se observe el buen recubrimiento de toda la semilla.

Compatibilidad:
Para un adecuado control de las plagas recomendadas (Picudo Chico y Picudo Grande de la soja), se recomienda mezclar este producto con fipronil 25%.

Fitotoxicidad:
No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
En caso de derrame del producto sin diluir, barrer y juntar el producto, y disponer según tratamiento de remanentes. En caso de producto diluido en agua, adsorber con arena u otro material inerte, juntar el material en contenedores bien cerrados y etiquetados, para disponer como residuo de acuerdo a lo especificado en la normativa aplicable. Asegúrese de delimitar el derrame, evitando la contaminación del agua de riego y de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar durante la aplicación botas, guantes y ropa protectora adecuada. Después de la aplicación lavarse todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto con abundante agua y jabón.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 1000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2000 mg/kg

No irritante ocular.
No sensibilizante dermal.
No irritante dermal.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: debido a su forma de aplicación, no presenta riesgos.
Toxicidad para aves: debido a su forma de aplicación, no presenta riesgos. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Toxicidad para peces: el patrón de uso no presenta riesgos de contaminación para aguas piscícolas u otras fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CURBIX 35 FS	BAYER	35846	FS	35%	II