THIENCARBAZONE-METHYL + ISOXAFLUTOLE + CYPROSULFAMIDE

Marcas comerciales: ADENGO.

Nomenclatura Química:
thiencarbazone-methyl: metil-4-({[(3-metoxi-4-metil-5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)carbonil]amino}sulfonil)-5-metiltiofeno-3-carboxilato
isoxaflutole: 5-ciclopropil-4-(2-metilsulfonil-4-trifluorometilbenzoil)isoxazole
cyprosulfamide: N-ciclopropil-4-[(2-metoxibenzoil)sulfamoil]benzamida
Clasificación Química: triazolina + isoxazol.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Amor seco (*Bidens pilosa)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Lecherón (**) (*Euphorbia spp.)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis)* Pasto braquiaria o Pasto bandera (*Brachiaria platyphylla)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Roseta (*) (*Cenchrus incertus)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	210 a 280 cm3/ha (***)		Puede ser aplicado en pre-emergencia o hasta segunda hoja completamente desarrollada del cultivo. Manejo Programado: Adengo en pre-emergencia seguido luego de un post-emergente con el cultivo en 4ta- 5ta hoja. Dosis de 210 cm3/ha para suelos livianos, baja infestación de pasto cuaresma, pata de ganso y capín. Dosis de 280 cm3ha para suelos medianos / pesados, alta infestación de pasto cuaresma, pata de ganso, pasto bandera y capín. (*) Control de roseta: aplicar Adengo únicamente en pre-emergencia de la maleza. (**) Control de lecherón: aplicar Adengo en mezcla de tanque con atrazina.
		300 a 400 cm3/ha		Manejo única aplicación (One Pass) en pre-emergencia: Dosis de 300 cm3/ha para suelos livianos, baja infestación de pasto cuaresma, pata de ganso, y capín. Dosis de 400 cm3/ha para suelos medianos / pesados, alta infestación de pasto cuaresma, pata de ganso, pasto bandera y capín. (*) Control de roseta: aplicar Adengo únicamente en pre-emergencia. (**) Control de lecherón: aplicar Adengo en mezcla de tanque con atrazina.

(***) Uso programado con un herbicida post-emergente (maíces convencionales, RR o HX). En los casos que lo requiera puede utilizarse con atrazina (alta densidad de malezas gramíneas).
Las dosis menores se recomiendan para suelos con más de 70% de arena y menos de 2% de materia orgánica (suelos livianos).

Se entiende por manejo programado a la aplicación de ADENGO® en pre-emergencia y luego un herbicida POE selectivo en maíz, por ejemplo glifosato en maíz RR, Liberty en maíces HX o Equip en maíces convencionales.

ADENGO® puede utilizarse con atrazina en los casos que se requiera como por ejemplo alta densidad de malezas gramíneas o lecherón. La dosis debe ajustarse según el tipo de suelo.

Información General:

Es un herbicida pre-emergente de acción sistémica vía floemática y xilemática.

Instrucciones de uso:
Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agregue la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque y complete el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación.

Equipo de aplicación: puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado, con una distribución uniforme de 30 a 40 gotas/cm2 con un coeficiente de variación menor a un 30%.
El volumen de aplicación deberá ser de 80 a 120 l/ha, trabajando a una presión de 35 a 45 lb/pulg2, con pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80° y 110°. Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida.

Advertencias:
- No aplique el producto en condiciones de "stress" hídrico y/o térmico para el cultivo y las malezas.

- No mezcle el producto con otros productos distintos de los indicados en esta etiqueta, ya que puede haber reducción de la actividad herbicida o daños al cultivo.
- No es compatible con organofosforados ni carbamatos.
- No agregar ningún tipo de coadyuvantes, ya sea humectantes, adherentes, sulfato de amonio o aceite, ya sea mineral o vegetal, en caso de aplicar el producto en post-emergencia del cultivo.
- En aplicaciones de post-emergencia del cultivo, aplicar el producto solo o en mezcla con atrazina.
- No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Limpieza de la pulverizadora:
Para evitar dañar a cultivos sensibles a este herbicida, luego de utilizar la pulverizadora es necesario eliminar los residuos de producto que pudieran haber quedado en la misma. Para ello, se recomienda seguir estos pasos:
1- Drene el tanque y enjuáguelo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. Utilice agua a presión.
2- Drene el tanque completamente y repita el paso anterior.
3- Llene el tanque con agua limpia y agréguele lavandina a razón de 0,5 litros por cada 100 litros de agua. Haga circular esa solución por mangueras y barras durante 15 minutos.
4- Tire la solución de lavandina y repita el paso anterior.
5- Desmonte filtros y picos, y lávelos separadamente.
6- Para eliminar la solución de lavandina, enjuague con agua el tanque, mangueras y barras.

Compatibilidad:
En caso de aplicar en mezcla con otros productos no indicados en la etiqueta, realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad:
Es totalmente selectivo a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Restricciones de uso:
Período de carencia: uso posicionado
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA) + F2 (HRAC) o 27 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata macho y hembra):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata macho y hembra):	CL50: > 2607 mg/m3
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante
Riesgos ambientales:	
Aves:	Prácticamente no tóxico.
Peces:	Prácticamente no tóxico.
Abejas:	Virtualmente no tóxico.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADENGO	BAYER	36254	SC	9% + 22,5% + 15%	III