TIOFANATO METIL + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: MYSTIC.

Nomenclatura Química:
tiofanato metil: 1,2 bis-(3 metoxicarbonil-2-tioureido) benceno
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1-1 dimetiletil)-1 H-1, 2, 4 triazol-1 etanol
Clasificación Química: bencimidazol + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum spp.)* Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*	1,0 l/ha	40	Desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5 (inicio de formación de granos), ante la aparición de los primeros síntomas. Aplicar si la enfermedad alcanza el umbral de acción para frenar su avance. Si las condiciones predisponentes persisten, repetir la aplicación a los 15 a 20 días después de la primera aplicación.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*			Desde R3 y hasta R5 ante la aparición de los primeros síntomas. Si las condiciones ambientales son predisponentes y/o el avance de la enfermedad es elevado, repetir la aplicación.
Maní	Viruela tardía del maní (*Mycosphaerella berkeleyi)* Viruela temprana del maní (*Cercospora arachidicola)*	1,25 - 1,5 l/ha	35	Al observarse los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones cada 14 a 21 días. En caso de condiciones ambientales predisponentes para la enfermedad, aplicar al menor intervalo.

Información General:

Fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y erradicante para el control de enfermedades de fin de ciclo y roya asiática en el cultivo de Soja, y para viruela temprana y tardía en el cultivo de maní.

Está compuesto por dos fungicidas sistémicos, uno de ellos es el tiofanato metil, fungicida de la familia de los bencimidazoles que tiene acción preventiva y curativa y cubre un amplio espectro de control de enfermedades. El tiofanato metil actúa interfiriendo principalmente en la división mitótica de los hongos susceptibles y secundariamente en la biosíntesis de ácidos nucleicos. El otro fungicida presente en la mezcla es tebuconazole, fungicida sistémico de la familia de los triazoles de acción preventiva, curativa y erradicante que además, logra un excelente control de la roya asiática de la soja. Tebuconazole actúa inhibiendo la síntesis de ergosterol, componente esencial de la membrana celular de los hongos fitopatógenos. La acción complementaria de tiofanato metil y tebuconazole logra un amplio espectro de control de enfermedades y permite un período amplio de aplicación debido a su acción preventiva, curativa y erradicante.

Equipos de aplicación: puede ser aplicado con equipos que logren una aplicación uniforme y estén provistos de sistemas de agitación del caldo de aplicación.

El volumen de aplicación debe ser de no menos de 200 l/ha de agua en aplicaciones terrestres y de 20 l/ha en aplicaciones aéreas. En aplicaciones terrestres, utilizar preferentemente pastillas del tipo cono hueco, con una presión de 60 a 80 libras por pulgada cuadrada, tratando de obtener de 20 a 30 gotas/cm2.

Preparación:
Agite bien el envase antes de verter su contenido en el tanque de la pulverizadora. Llene el depósito de la pulverizadora hasta la mitad o bien hasta las tres cuartas partes y con el agitador o el retorno en marcha agregue el producto según la dosis a utilizar. Complete con agua. Utilice siempre agua limpia. Durante la aplicación mantenga el caldo de aplicación en permanente movimiento ayudado por el agitador o el retorno.

Advertencia: no aplicar con elevada temperatura, baja humedad, vientos mayores a 10 km/h, presencia de rocío o probabilidad de lluvia.

Almacenamiento: en lugares secos, frescos en su envase original herméticamente cerrado, bien etiquetado, lejos de los niños y personas inexpertas.

Derrames:

Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra o arena para contener y adsorber el derrame. El material adsorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 1 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.

Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 1,00 mg/l

Irritación dermal: No irritante dermal
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Primeros auxilios:
Ingestión: si la ingesta fue accidental administrar abundante cantidad de agua asegurándose que las vías respiratorias estén abiertas. Nunca suministrar nada por boca ni inducir el vómito a una persona inconsciente. No dar a beber leche ni aceite.
Inhalación: alejar al aire fresco y obtener asistencia médica.
Piel: quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua y jabón neutro. Asistencia posterior por médico.
Ojos: lavar con abundante agua limpia por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados separados y haciendo mover lentamente los ojos en todas las direcciones, luego control por oftalmólogo.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

Evitar contaminar fuentes de agua superficiales o subterráneas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MYSTIC	NUFARM S.A.	36284	SC	37,5% + 10%	III