TIOFANATO METIL + TIRAM + ETHABOXAM

Marcas comerciales: DANJIRI ST - TOPSEED EXTRA.

Nomenclatura Química:
tiofanato metil: dimetil [(1,2-phenylene(bis(iminocarbonothionyl)] biscarbamato
tiram: bis(dimetilthio-carbamoyl)disulfide
ethaboxam: N-(cyano-2-thienylmethyl)-4-ethyl-2-(ethylyamino)-5-thiazolecarboxamide
Clasificación Química: benzimidazol + dimetilditiocarbamato + tiazolocarboxamida.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas y fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja (Tratamiento de semillas)	Antracnosis de la soja (*Colletotrichum glycines)* Cancro del tallo (*Phomosis phaseoli f. sp. meridionalis)* Dumping-off (*Pythium spp.)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Podredumbre de la semilla y la corona (*Fusarium spp.)* Podredumbre de las semillas (*Alternaria spp.)* Podredumbre de semilla (*Phomosis sojae)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*	200 cm3/100 kg de semilla.		El tratamiento de semilla deberá realizarse en el momento previo a la siembra.

Información General:

Modo de acción: es un fungicida que contiene tres principios activos: tiofanato metil, tiram y ethaboxam. El tiofanato metil es un fungicida bencimidazol sistémico, ejerce un control preventivo y curativo de enfermedades. El tiram, un ditiocarbamato, por su acción de contacto realiza una eficaz protección preventiva. El ethaboxam pertenece a la familia de las tiazolocarboxamidas. Actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento del micelio, genera una migración del núcleo celular e inhibe la respiración mitocondrial. Tiene acción de contacto y sistémica.
DANJIRI ST es una triple mezcla de acción sistémica y de contacto de amplio espectro y con acción persistente en el tiempo, que confiere control de hongos presentes en la semilla y en el suelo que pueden afectar el desarrollo normal de las plántulas. No afecta la germinación de las semillas ni su emergencia. DANJIRI ST reduce la incidencia de los patógenos transmitidos por semilla.

La acción combinada de los tres activos protege al cultivo desde la siembra, evitando la propagación de las enfermedades transmitidas por la semilla e impidiendo que los hongos del suelo afecten a las plántulas que están naciendo. Formulado en suspensión concentrada para el tratamiento de semillas, la dosis recomendada no afecta el poder germinativo de las semillas que no presenten daños mecánicos.

Forma de aplicación: suspender la dosis de 200 cm3 en agua para tratar 100 kg de semilla.

Equipos: para grandes cantidades, emplear plantas de tratamiento de semillas, utilizando los volúmenes de suspensión y las especificaciones del fabricante del equipo. Para pequeñas cantidades, utilizar tambores rotativos con eje excéntrico.
Al igual que con cualquier terápico de semillas, si se usa junto con inoculantes, se recomienda aplicar primero el fungicida y luego realizar la inoculación con Rhizobium spp. Sembrar dentro de las 6-12 horas de realizado el tratamiento.

Compatibilidad: este fungicida puede ser mezclado con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y química de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Restricciones de uso: las semillas tratadas no deben usarse como alimento, forraje o para la extracción de aceites. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con granos destinados al consumo humano o animal.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y adsorber empleando tierra o arena. El material adsorbido deberá ser barrido y colocado en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales. Lavar las superficies

contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC) + 1 (FRAC) + 22 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, protección respiratoria, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata : > 3129 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 4000 mg/kg.
CL 50 Inhalatoria: 0,99 mg/l (4 horas)

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Severo irritante
Sensibilizante dermal: No sensibilizante.

Riesgos ambientales: producto ligeramente tóxico para abejas y para aves. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada con este producto, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Antídoto: no se conoce uno específico. En caso de ingestión provocar el vómito. Dar papilla de carbón activado. Tratamiento sintomático.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
DANJIRI ST	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	36350	FS	15% + 30% + 0,5%	III
TOPSEED EXTRA	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	36636	FS	15% + 30% + 0,5%	III