AZOXISTROBINA + TEBUCONAZOLE

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-iloxi] fenil}-3-metoxiacrilato
tebuconazole: alfa -[2-(4 clrofenil)etil)-alfa(1-1 dimetiletil)- 1 H -1,2,4triazol-1-etanol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Roya blanca del girasol (*Albugo tragopogonis)*	PC 12%+20%: 0,6 l/ha + 0,5 l/ha de coadyuvante	28	Aplicar al aparecer los primeros síntomas, a partir del estadio vegetativo V7-V8 (7-8 pares de hojas verdaderas con más de 4 cm de longitud). En caso de reinfección, repetir la aplicación en R1 (estrella o botón floral visible).
Maíz	Roya del maíz (*Puccinia sorghi)*	PC 12%+20%: 0,7 l/ha + 0,5 l/ha de coadyuvante PC PC 8%+16%: 1L/ha	60	Aplicar a la aparición de las primeras pústulas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V6 - V8 (6 - 8 hojas desplegadas) hasta panojamiento (R1).
	Tizón (*Helminthosporium turcicum)*			Aplicar a la aparición de los primeros síntomas, en estadios vegetativos del cultivo a partir de V10 (10 hojas desplegadas).
Papa	Tizón temprano (*Alternaria solani)*		30	Aplicar cuando se den las condiciones predisponentes de la enfermedad, a partir de los 70 días del cultivo y cada 14 días.
Soja	Alternaria (*Alternaria spp.)* Antracnosis (*Colletotrichum truncatum)* Mildiu (*Peronospora manshurica)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Tizón del tallo y de la vaina (*Phomopsis sojae)*	PC 12%+20%: 0,5 l/ha + 0,5 l/ha aceite coadyuvante		Aplicar en inicio de formación de vainas (R3) hasta R5.5 o con la aparición de los primeros síntomas. En caso de ser necesario, realizar una segunda aplicación.
	Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)*	PC 8%+16%: 700 - 800 cm3/ha + 0,5% de coadyuvante no iónico		A partir de R3 (comienzo de fructificación) hasta R5.5 (máximo tamaño de semilla), cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
	Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	PC 12%+20%: 0,5 l/ha + 0,5 l/ha aceite coadyuvante PC 8%+16%: 700-800 cm3/ha(*) + 0,5% de coadyuvante no iónico		Aplicar al observar los primeros síntomas. En caso de persistir condiciones favorables para la enfermedad y que aparezcan nuevas pústulas, realizar una segunda aplicación. (*) Usar la dosis mayor en condiciones predisponentes severas.
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha de la hoja del trigo (*Septoria tritici)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)*	PC 12%+20%: 0,7 l/ha + 0,5 l/ha de coadyuvante PC 8%+16%: 900-1000 cm3/ha + 0,5% de coadyuvante no iónico	35	PC 12%+20%: aplicar al aparecer los primeros síntomas. PC 8%+16%: aplicar en hoja bandera totalmente desplegada (Zadok 3.9 a 4.3) al aparecer los primeros síntomas en la planta.

Información General:

Fungicida sistémico y de contacto con efectos preventivos, curativos y erradicantes. Su modo de acción se basa en la combinación de sus principios activos: tebuconazole y azoxistrobina. El primero, perteneciente a las familia química de los triazoles, inhibe la biosíntesis del ergosterol del hongo parásito de la planta huésped, impidiendo la multiplicación del hongo. En cambio la azoxistrobina, perteneciente al grupo químico de los metoxiacrilatos, actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno. Además, la azoxistrobina posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos. En consecuencia, presenta una prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, favoreciendo el llenado de granos.

Recomendaciones
No aplicar cuando los cultivos estén bajo situaciones de stress tales como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas o heladas pues el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
Advertencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a fungicidas, lo cual podría verse reflejado en falta de efectividad del producto. Para evitar la generación de resistencia se recomienda rotar con fungicidas de distinto modo de acción.

PREPARACIÓN:

Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Agréguese la dosis del coadyuvante primero y luego la del producto en el tanque de la máquina ya cargado con agua hasta la mitad de su volumen y luego, con los agitadores en funcionamiento, completar el resto del volumen de agua.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
El producto debe ser aplicado luego de que se seque el rocío. En condiciones climáticas favorables. No aplicar en horas de máxima insolación. No aplicar con vientos superiores a 10 km/ha. Para obtener un resultado eficaz se deben lograr entre 20 y 30 gotas/cm2

Aplicaciones terrestres:
Máquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas, con barras provistas de cono hueco o XR Teejet. La presión de los picos debe ser superior a 40 lb/pulg2 y el caudal de aplicación debe ser de no menos de 150 litros/ha.
Para un buen control es indispensable lograr una buena penetración del producto y una cobertura total y uniforme del lote.

Aplicaciones aéreas:
El volumen mínimo de aplicación debe ser de no menos de 15 l/ha. No deben realizarse aplicaciones con gas oil. El producto debe ser aplicado junto con el coadyuvante.

Compatibilidad:
El producto puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de utilizarse en mezcla se recomienda realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.
Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:	
Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >5000 mg/kg(*) >2000 mg/kg(**)
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >4000 mg/kg(*) >2000 mg/kg(**)
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: >3,22 mg/l (Clase III)
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante
Riesgos ambientales	
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico(*). Ligeramente tóxico(**)
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico(*). Ligeramente tóxico(**)

(*) del producto Adama Custodia
(**) del producto Ikatu

Se recomienda dejar una franja de seguridad de 50 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. No contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de pulverizaciones, limpieza de equipos ni envases de plaguicidas en acequias o ríos.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.