Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

IMIDACLOPRID + BIFENTRIN

Marcas comerciales: ADAMA GALIL.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida
bifentrin: (2-metil(1,1-bifenil) - 3-il) metil 3 - (-2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
Clasificación Química: neonicotinoide + piretroide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: acaricida e insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Alquiche chico (*Edessa meditabunda)* Chinche espinosa (*Dichelops furcatus)*	250 cm3/ha	30	Aplicar de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA. Cuando se observen 0,9 chinches/m.
	Chinche de la alfalfa (*Piezodorus guildinii)* Chinche verde (*Nezara viridula)*			Aplicar de acuerdo a los umbrales establecidos por INTA. A partir de 0,3 chinches/m cuando la soja esté en estado de formación de vainas (R3-R4); o a partir de 0,5 chinches/m cuando la soja se encuentre en formación de granos (R5).
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga medidora (*Pseudoplusia includens)*			Aplicar al llegar al umbral de 10 - 20 orugas mayores a 1,5 cm/m.
	Picudo negro de la vaina (*Rhyssomatus subtilis)*			Comenzar la aplicación al observar 2 a 3 adultos por metro (igual dosis) lineal.
	Trips (*Caliothrips phaseoli)*			Se recomienda efectuar controles luego de R3, cuando se observen hojas con plateado o necrosado por trips, en la mitad inferior del canopeo y haya más de 10 individuos por folíolo en la parte superior del cultivo.
	Tucuras (*Dichroplus spp.)*			De acuerdo a los siguientes umbrales: estadios VC- V4: 2 tucuras/metro o estadios V5 - R5: 5 tucuras /metro. Se debe asegurar una optima calidad de aplicación especialmente luego del cierre del surco.

Información General:

Insecticida que actúa por contacto, ingestión y por vía sistémica. Combina la doble acción de sus principios activos. El imidacloprid es un insecticida del grupo de las nitroguanidinas que interfiere la transmisión de los estímulos nerviosos del sistema nervioso central de los insectos. El otro activo bifentrin es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión sobre lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin, según legislación local vigente.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta / protección respiratoria, sombrero, y botas de goma.
Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda: 300 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg (rata)
CL 50 inhalación aguda: > 1,96 mg/l (rata) NOCIVO.

CUIDADO. Mínimamente irritante ocular. Leve sensibilizante dermal.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

Tratamiento sintomático y dar terapia de soporte. No hay antídoto específico.

Riesgos ambientales
Aves: Producto moderadamente tóxico.
Peces: Producto muy tóxico, por lo que se recomienda dejar una franja de seguridad de 50 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. No contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de pulverizaciones, limpiezas de equipos ni envases de fitosanitarios en acequias o ríos.
Abejas: Altamente tóxico. No asperjar sobre colmenas en actividad. Si no puede trasladárselas, tapar las piqueras durante la aplicación con arpillera húmeda o espuma de goma. Asperjar durante la mañana temprano o al atardecer fuera del horario de pecoreo de las abejas. Si existe sistema de alarma informar a los apicultores en forma fehaciente.

NO contaminar fuentes de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA GALIL	ADAMA ARGENTINA SA	35970	SC	25% + 5%	II