Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

TEBUCONAZOLE + IMAZALIL + IMIDACLOPRID

Marcas comerciales: SAVAGE ULTRA PACK.

Nomenclatura Química:
Tebuconazole: Alfa -[2-(4 clrofenil)etil)-alfa(1-1 dimetiletil)- 1 H -1,2,4triazol-1-etanol
Imazalil: 1-2 [2,4 diclorofenil)-2-(2-propenofenoxi) etil] - 1 H -imidazol
Imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida.
Clasificación Química: triazol + imidazol + neonicotinoide.
Acción: de contacto, sistémica, preventiva, curativa, erradicante y curasemillas sistémica.

Uso: curasemillas, fungicida e insecticida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón volador (*Ustilago nuda)* Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Gorgojo del trigo (*Listronotus bonariensis)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Maecolaspis sp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Hongos del suelo (*Tilletia spp.)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	Dosis (parte líquida 1): 150 cc/q Dosis (parte líquida 2): 100 cc/q		Tratar la semilla previa a la siembra.
Avena común	Ciclocéfalas, Gusano blanco (*Cyclocephala spp.)* Gusano alambre (*Dyscinetus gagates)* Gusano alambre (*Conoderus spp.)* Gusano blanco (*Maecolaspis sp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Gusano blanco o Vaquita tornasolada (*Colaspis spp.)* Gusanos alambre (*Agriotes spp.)* Helmintosporiosis de la avena (*Drechslera avenae)* Pulgón verde de los cereales (*Schizaphis graminum)*	Dosis (parte líquida 1): 100 cc/q Dosis (parte líquida 2): 175 cc/q		

El producto no altera el poder germinativo de las semillas.

Información General:

Es un insecticida y fungicida curasemillas de amplio espectro con propiedades preventivas, curativas y erradicantes. Su acción es de contacto, ingestión y por vía sistémica. Sus componentes, Tebuconazole + Imazalil e Imidacloprid actúan sobre una amplia gama de plagas y enfermedades para los cultivos de trigo y avena. El Tebuconazole pertenece a la familia de los triazoles, y el Imazalil pertenece a la familia de los imidazoles. Por la otra parte, el Imidacloprid es un derivado del grupo de las nitroguanidinas. Actúa protegiendo a la semilla y a la plántula en los primeros estadios de su desarrollo.
Actúa sobre cepas resistentes a benzimidazoles y a triazoles.

Instrucciones para el uso

Preparación:
Las dosis recomendadas parte líquida 1 + parte líquida 2 se mezclan con 2 litros de agua por cada 100 kilos de semilla en equipos especiales diseñados para el tratamiento de semillas.
Mezclar hasta obtener una homogénea cobertura de la semilla.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

La semilla a tratar debe ser ventilada previamente, para eliminar todo resto de paja, polvo, etc.
Debe tener buena energía germinativa y poder germinativo y se deben evitar las subdosificaciones.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
El equipo a utilizar debe estar diseñado para aplicación de productos curasemillas. En todos los casos se debe lograr cubrir con el producto a las semillas en forma uniforme y homogénea.
Introducir las semillas al equipo aplicador, luego incorporar el producto (previa dilución de las dosis con 2 litros de agua cada 100 kilos de semilla) y mezclar hasta obtener una adecuada distribución del producto sobre las semillas.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material absorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior disposición final según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 3 (FRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la aplicación utilizar protección respiratoria, antiparras, botas y guantes de goma. Usar vestimenta adecuada, limpia, evitando la que se hubiera contaminado por uso anterior, sin previo lavado cuidadoso. Finalizada la tarea, lavarse prolijamente con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No fumar, comer o beber durante la utilización. Evitar la contaminación del agua de riego y de uso doméstico. Lavar prolijamente los utensilios empleados en la preparación del producto.

Información Toxicológica:

Del principio activo Tebuconazole:
DL 50 aguda oral en rata: > 4000 mg/kg.
DL 50 dermal en rata: > 5000 mg/kg.

Del principio activo Imazalil:
DL 50 aguda oral en rata: 227-343 mg/kg.
DL 50 dermal en rata: 4200-4880 mg/kg.

Principio activo Imidacloprid:
DL 50 oral aguda: > 450 mg/kg (rata). DL 50 dermal aguda: > 5000 mg/kg (rata).
CL 50 inhalación aguda: > 5323 mg/m3 (rata).

Del producto formulado:
Moderadamente irritante ocular.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico.
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
No presenta riesgos para las abejas debido a su modo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SAVAGE ULTRA PACK	MAGAN ARGENTINA	PK043	FS	2% + 3% + 60%	II