ACETOCLOR + ATRAZINA

Marcas comerciales: GUARDIAN X-TRA.

Nomenclatura Química:
acetoclor: 2-cloro-N(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)-acetamida.
atrazina: 2,cloro-4-(etilamino)-6-(isopropilamino)s-triazina
protector: 3-(dicloroacetil)-5-(2-furanil)-2,2-dimetiloxazolidine

Clasificación Química: cloroacetamida + triazina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (pre-emergente/pre-siembra).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz	Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Cepa caballo (*Xanthium spinosum)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*) (*Datura ferox)* Chinchilla (*Tagetes minuta)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Nabo (*Brassica campestris)* Ortiga (*Urtica urens)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Poa (*Poa annua)* Quínoa, Quínoa blanca (*) (*Chenopodium album)* Revienta caballo (*Solanum elaeagnifolium)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Trébol (*Medicago lupulina)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus spp.)* Zapallito amargo (*Cucurbita andreana)*	Según suelo.		Pre-emergencia. La dosis varía según el tipo de suelo: Liviano (arenoso, arenoso-limoso, franco-arenoso) 3,5 l/ha. Mediano (franco-arcillo-arenoso, franco-arcillo-limoso, limoso) 4,0 l/ha. Pesado (arcillo-arenoso, franco-arcilloso, franco-arcillo-limoso, arcillo-limoso, arcilloso) 4,5 l/ha. * Control parcial. Elimina 70 - 80% de la población cuando hay altas infestaciones, las plantas no controladas muestran sensible reducción de crecimiento.

Información General:

Es un herbicida selectivo para el control en pre-emergencia de malezas gramíneas y de hoja ancha, en el cultivo de maíz.

Es un herbicida a base de acetoclor y atrazina más un protector que brinda seguridad extra al cultivo, en caso de que ocurran inclemencias climáticas, superposición de aplicaciones u otro problema que podría afectar al cultivo de no contar con esta protección adicional.

El producto requiere humedad para entrar en la solución del suelo y activarse. La ocurrencia de una lluvia dentro de los 10 días posteriores a la aplicación permitirá que el herbicida se active adecuadamente y sea totalmente efectivo. La cantidad de agua requerida para activar el herbicida es menor cuando se aplica sobre suelo húmedo.

El producto no requiere incorporación mecánica.
En planteos de siembra directa se recomienda combinar la aplicación de acetoclor + atrazina 51,6% + 20,4% con ROUNDUP FULL II o ROUNDUP ULTRAMAX, según se trate de aplicaciones de pre-siembra o de post-emergencia sobre maíces RR2.
En planteos convencionales, se recomienda aplicar dentro de las 48 hs posteriores a la última remoción mecánica del suelo, para evitar que haya malezas naciendo antes de que el herbicida se active. Las malezas que emergieran se podrían controlar con una posterior pasada rápida y liviana de rastra rotativa. Esta labor no afectará la actividad del producto, obteniéndose mejores resultados cuando se realiza 12 a 14 días después de la siembra.

Instrucciones para el uso

El producto se presenta formulado como una suspensión concentrada, debiéndose mezclar con agua limpia para su aplicación como pulverizado.
En aplicaciones terrestres, en cobertura total, debe usarse un volumen de 80 a 140 litros de agua, a una presión de trabajo de 25 a 40 lb/pulg2.

Se recomienda agregar agua al tanque hasta un tercio o la mitad de su capacidad, luego, con el agitador en marcha, verter lentamente la cantidad recomendada de producto y, finalmente, completar el llenado del tanque. Se debe mantener el agitador en funcionamiento durante la pulverización.

Restricciones de uso

No se establece período de carencia por uso posicionado.
El producto se descompone gradualmente y no afecta a los cultivos posteriores cuando han transcurrido entre 4-6 meses de aplicado. Si por algún motivo es preciso sembrar dentro de los tres meses de aplicado, se recomienda sembrar nuevamente maíz. Otros cultivos pueden sufrir daños si se siembran en suelos tratados con el producto dentro de este período.
La atrazina puede filtrarse o lixiviarse a través del suelo y alcanzar aguas subterráneas si se utiliza fuera de las recomendaciones de uso de esta etiqueta. No se aconseja a los usuarios aplicar el producto a suelos arenosos o limosos en los cuales la napa freática se encuentra cercana a la superficie y a los suelos que son muy permeables, bien drenados.

Compatibilidad

Es compatible con otros herbicidas residuales y con productos a base de glifosato.

Fitotoxicidad
No se han observado siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos
Enjuagar los envases vacíos por lo menos tres veces, el agua de enjuague debe verterse en la pulverizadora, antes de su aplicación; inutilizarlos y finalmente disponerlos de acuerdo a lo especificado en la normativa aplicable.

Almacenamiento
Mantenga el producto en su envase original, rotulado y bien cerrado, en lugar seco y fresco a temperaturas superiores a 0°C.

Derrames:
En caso de derrame adsorber con tierra desmenuzada u otro material adsorbente inerte adecuado, recolectar cuidadosamente y disponer el total del material según regulaciones locales. Usar elementos de protección personal. Limpiar el área de derrame evitando la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.

Clasificación (modo o sitio de acción): K3(HRAC) o 15(WSSA) + C1(HRAC) o 5(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.
Mezclar el producto al aire libre, usando antiparras, guantes y ropa protectora.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 0,87 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante

Sensibilización dermal: Sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Muy tóxico

Dejar distancia mínima de 3 metros de área labrada entre tratamientos y espejos de agua (zona buffer). No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
GUARDIAN X-TRA	MONSANTO ARGENTINA SRL	36150	SC	51,6% + 20,4%	IV