FLUOXASTROBIN

Marcas comerciales: EVITO.

Nomenclatura Química:
fluoxastrobin: (E)-{2-[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoropirimidin-4-iloxi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) metanona O-metiloxima
Clasificación Química: estrobilurina.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya anaranjada (*Puccinia recondita)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*	100 cm3/ha + 300 cm3/ha de tebuconazole 43%	35	Acción preventiva: A la aparición de los primeros síntomas.
		130 cm3/ha de + 390 cm3/ha de tebuconazole 43%		Acción curativa: Cuando las enfermedades evolucionan rápidamente o cuando al momento de la aplicación se registra alta incidencia y severidad.
Soja	Mancha marrón de la soja (*Septoria glycines)* Mancha púrpura de la soja (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	97 cm3/ha + 290 cm3/ha tebuconazole 43%	30	Acción curativa: Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas. En caso de persistir las condiciones favorables para el avance de las enfermedades o al aparecer nuevas manchas y/o pústulas realizar una segunda aplicación.
		80 cm3/ha + 240 cm3/ha tebuconazole 43%		Acción preventiva: Aplicar de modo preventivo y/o ante condiciones predisponentes. Aplicar desde R1 (inicio de floración) a R5 (máximo desarrollo de semilla), o cuando se observen los primeros síntomas en la planta.
Maíz	Roya común del maíz (*Puccinia sorghi)* Tizon foliar (*Helminthosporium maydis)* Tizon tardío (*Helminthosporium turcicum)*	110 cm3/ha + 330 cm3/ha tebuconazole 43%	60	Acción curativa: Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas.
		130 cm3/ha + 160 cm3/ha	21	Acción preventiva/Health effect: Aplicar de modo preventivo y/o ante la aparición de los primeros signos y/o síntomas en estadios vegetativos tempranos a partir de V6-V8 (6-8 hojas expandidas) hasta panojamiento pleno-desarrollo temprano de la mazorca (R1/R3).
		90 cm3/ha + 270 cm3/ha de tebuconazole 43%	60	Acción preventiva: Aplicar ante condiciones predisponentes en estadios vegetativos del cultivo a partir de V6-V8 (6-8 hojas desplegadas) hasta panojamiento (R1/R2).
Maní	Viruela temprana del maní *(Cercospora arachidicola)* Viruela tardía del maní *(Cercosporidium personatum*) Roya del maní (*Puccinia arachidis)*	230 - 260 cm3/ha 130 + 1.390 cm3/ha clorotalonil 72% a 150 +1.580 cm3/ha clorotalonil 72%	15	Acción curativa: Aplicar con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y continuar cada 2-3 semanas (máximo 2 aplicaciones en la temporada). Las dosis más altas para condiciones de mayor severidad.
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)* Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana)* Roya de la hoja (*Puccinia hordei)*.	97 cm3/ha + 290 cm3/ha tebuconazole 43%	21	Aplicar ante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar solo 1 aplicación por temporada.
Papa	Sarna negra de la papa *(Rhizoctonia solani*)	1.000 -1.500 cm3/ha (más coadyuvante)	15	Aplicar en aspersión al suelo y al momento de la plantación sobre el fondo y paredes del surco y cubriendo los tubérculos. Aplicar con un caudal de 300 a 400 litros por ha dirigidos al surco de plantación.
	Tizón temprano de la papa (*Alternaria solani)*	300 a 500 cm3/ha + 1.500 cm3/ha clorotalonil 72%		Acción curativa: Aplicar con síntomas presentes de la enfermedad. Las dosis más altas para condiciones de mayor severidad. Repetir la aplicación si persisten las condiciones predisponentes y/ o se manifiesten nuevos síntomas de la enfermedad.

Información General:

Es un fungicida de amplio espectro que controla enfermedades en cultivo de trigo, maíz, soja, cebada, maní y papa.
Está compuesto por fluoxastrobin, ingrediente activo con avanzada tecnología, favorables características toxicológicas y ventajoso comportamiento ambiental. El mismo actúa inhibiendo la respiración mitocondrial, obstruyendo la transferencia de electrones en la mitocondria del patógeno.
En mezcla con otros fungicidas, inclusive de diferentes clases químicas, ofrece una gran compatibilidad y eficiente capacidad anti-resistencia.

Gracias a su acción sistémica en la hoja, posee propiedades preventivas y curativas, ya que no solo actúa sobre la germinación de las esporas, sino también sobre el crecimiento del micelio, ofreciendo una protección prolongada

Instrucciones para el uso
Preparación:
Verificar el vencimiento del producto. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, añadir corrector/secuestrante (si fuera necesario), agregar la cantidad de producto según dosis, por último incorporar al caldo el coadyuvante y/o aceite. Finalmente, completar con agua el volumen requerido, manteniendo siempre los agitadores en marcha.
Prepare lo que calcula que utilizará en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.
Si por cualquier causa la aplicación se interrumpiese durante algunas horas, antes de reiniciarla se deberá agitar algunos minutos para re-homogeneizar el preparado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Se aplica de manera preventiva y curativa ante la aparición de los primeros síntomas de enfermedades foliares.
Cuando el nivel de la infección sea avanzado, o las condiciones ambientales sean predisponentes para un rápido desarrollo de la misma, se recomienda utilizar la mayor de las dosis indicadas.
Puede ser aplicado con pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este complemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante del caldo a través del retorno. Es importante lograr un correcto mojado de las plantas, utilizando un volumen de agua para aplicación terrestre de no menos de 150 l/ha y presión mayor a 75 lb/pulg2 y en aplicación aérea no menos de 15-20 l/ha. El número de impactos deberá ser mayor a 50-70 gotas/cm2 con un diámetro inferior a 130 micrones.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/h. No realizar las aplicaciones con temperaturas mayores a 30°C; tampoco si el follaje se encuentra mojado o existe posibilidad de una lluvia inminente.
Se recomienda la aplicación de EVITO® asociada a un coadyuvante, el cual será agregado con posterioridad a la mezcla de los fungicidas en el caldo de aplicación.
En todos los cultivos se recomienda preferentemente el uso de coadyuvantes de base oleosa mineral o vegetal metoxilado al 0,5% -1,0% (0,5 -1,0 L /100 litros de agua), excepto en la aplicación de EVITO® al surco de papa.

Restricciones de uso:
-NO aplicar el producto cuando el cultivo esté bajo situaciones de estrés tales como sequía prolongada, baja fertilidad, ataques de insectos, bajas temperaturas o heladas, porque el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
-NO aplicar el producto, si se espera una lluvia inminente, ya que el control puede ser no satisfactorio.
-NO realizar las aplicaciones con temperaturas mayores a 30°C

Período de carencia: entre la última aplicación y la cosecha deberá transcurrir el siguiente período: trigo: 35 días; soja: 30 días; papa y maní: 15 días, cebada y maíz: 21 días (en caso de utilizarse en mezcla con tebuconazole, el período de carencia para el cultivo de maíz será de 60 días).

Tiempo de reingreso al área tratada: no reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Estrategia anti-resistencia: de modo tal de evitar la aparición de cepas de hongos resistentes, se recomienda alternar la aplicación del producto con aquellos que posean diferente modo de acción bioquímico. No reiterar la aplicación en más de dos oportunidades durante el ciclo del cultivo.

Compatibilidad:
Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos (fungicidas, insecticidas, coadyuvantes y bioestimulantes) de reacción neutra. No se recomienda aplicar junto a herbicidas. No aplicar en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes y de fitotoxicidad para el cultivo. No preparar mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

Fitotoxicidad:
No es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej. tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda LD50 (rata): > 5.000 mg/kg.
Toxicidad dermal aguda LD50 (rata): > 5.000 mg/kg.
Toxicidad de inhalación aguda LC50 (rata): > 2.170 mg/m3.

Irritación Ocular: Moderado irritante ocular. Categoría III: (Cuidado). Causa irritación moderada a los ojos.
Irritación dermal: Leve irritante dermal. Categoría IV: (Cuidado).
Sensibilización dermal: Sensibilizante dermal. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacción alérgica.
Toxicidad Inhalatoria: Categoría III: (Cuidado).

En caso de intoxicación llame al médico. Coloque al paciente en lugar ventilado.
En caso de contacto con los ojos: enjuagarlos con abundante agua limpia por espacio 15 minutos.
En caso de contacto con la piel: quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminado, lavar con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: retire a la persona al aire fresco y manténgalo en reposo.
En caso de ingestión NO provocar el vómito. NO administre nada por boca a un paciente inconsciente.

Toxicidad para aves: Prácticamente No tóxico.
Toxicidad para peces: Muy tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existiera agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad de 30 metros entre el cultivo tratado y dichas superficies de agua como medida de precaución. Después de la limpieza de los equipos de pulverización, asperjar el agua remanente sobre un campo natural, alambrado o camino de tierra, siempre alejado de lugares poblados. No contaminar fuentes de agua.
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
EVITO	UPL ARGENTINA S.A.	35480	SC	48%	IV