FIPRONIL + LAMBDACIALOTRINA

Nomenclatura Química:
fipronil: (1)-5-amino-1-(2,6-dicloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-tolil)-4 trifluorometil sulfinyl pirazole-3-carbonitrilo.
lambdacialotrina: mezcla de isómeros (ZR cis S y ZS cis R) del- alfa-ciano-3- fenoxibencil-cis-3-(Z-2- cloro- 3,3,3- trifluoroprop-1-enil)-2,2- dimetil ciclopropano carboxilato

Clasificación Química: fenilpirazol + piretroide.
Acción: de contacto e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	50 cm3/ha	5	Aplicar antes o después de la emergencia del cultivo. En este último caso cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas cada 100 plantas o el 3% de daño). Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes.
		62,5 cm3/ha		Aplicar antes de sembrar el cultivo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o en ataques en año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-siembra incorporándolo superficialmente al suelo.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	87,5 cm3/ha		Cuando se observen 3 isocas por planta. Lograr una buena penetración en todo el follaje del cultivo.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	42,5 - 67,5 cm3/ha		Cuando se observen los primeros ataques. Cuando el cultivo no sobrepase los 50 cm de altura usar la dosis menor.
Maíz	Chicharrita (*Delphacodes kuscheli)*	87,5 cm3/ha	*	Emergencia del coleoptile y repetir la misma dosis a los 5 días.
	Gusano de la caña de azúcar, Barrenador de la caña de azúcar, Taladro de la caña de azúcar (*Diatraea saccharalis)*	165 cm3/ha		Aplicar al nacimiento de las larvas provenientes de huevos depositados en el pico de oviposición. Se recomienda el asesoramiento de un Ingeniero Agrónomo para realizar el seguimiento de la plaga.
	Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	50 cm3/ha		Aplicar antes o después de la emergencia del cultivo. En este último caso cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas cada 100 plantas o el 3% de daño). Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes.
		62,5 cm3/ha		Aplicar antes de sembrar el cultivo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o en ataques en año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-siembra incorporándolo superficialmente al suelo.
	Isoca de la espiga (*Heliothis zea)*	125 cm3/ha		Con sistema de monitoreo, aplicar al observarse deposición de huevos en los estigmas.
	Oruga cogollera (*Spodoptera frugiperda)*	75 - 125 cm3/ha		Aplicar en presencia de las primeras hojas raspadas. En caso de zona endémica, repetir las aplicaciones semanalmente. Con cultivos de menos de seis hojas, recurrir a la dosis inferior y emplear dosis más altas con cultivos de mayor tamaño.
Soja	Barrenador del brote (*Epinotia aporema)*	67,5 cm3/ha	5	Antes de floración, cuando se observen 15 a 20 orugas de 1,5 cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar.
		87,5 cm3/ha		Después de floración, cuando se observen 10 a 15 orugas por metro lineal de cultivo o 10% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	37,5 - 50 cm3/ha		Cuando se observen 15 a 20 isocas > de 1,5 cm por metro lineal de cultivo y más de 20% de daño foliar. Usar la dosis menor cuando las plantas son aún pequeñas.
	Oruga de las leguminosas	67,5 cm3/ha		Antes de floración, cuando se observen 15 a 20 orugas de 1,5

	(*Anticarsia gemmatalis)*			cm por metro lineal de cultivo o más del 20% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar.
		87,5 cm3/ha		Después de floración, cuando se observen 10 a 15 orugas por metro lineal de cultivo o 10% de daño foliar. Lograr buena penetración foliar.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	37,5 - 50 cm3/ha		Cuando se observen 15 a 20 orugas o isocas mayores de 1,5 cm por metro lineal de cultivo y más de 20% de daño foliar. Usar la dosis menor cuando las plantas son aún pequeñas.
	Tucuras (*Dichroplus elongatus)*	100 - 120 cm3/ha		Aplicar cuando se observen 5 a 6 tucuras en estado de saltonas por m2.
Sorgo granífero	Gusanos cortadores (*Agrotis spp.)*	50 cm3/ha		Aplicar antes o después de la emergencia del cultivo. En este último caso cuando se observe presencia de la plaga o plantas cortadas (3 orugas cada 100 plantas o el 3% de daño). Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o con ataques el año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-emergentes o post-emergentes.
		62,5 cm3/ha		Aplicar antes de sembrar el cultivo. Dado el hábito nocturno de las orugas cortadoras se recomienda aplicar al atardecer o por la noche y con buena humedad en el suelo, lo que favorece la movilidad de la plaga y su control. Cuando se haya detectado la presencia de la plaga previamente con el uso de cebos tóxicos, o preventivamente en lotes provenientes de pasturas o en ataques en año anterior. Puede aplicarse solo o en mezclas con herbicidas pre-siembra incorporándolo superficialmente al suelo.
	Mosquita del sorgo (*Contarinia sorghicola)*	87,5 cm3/ha		Cuando haya una mosquita promedio por panoja comenzando con 90% de panojamiento y 10% de floración. Repetir a los 7 días con floración prolongada o alta infestación de la plaga.
	Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	42,5 - 67,5 cm3/ha		Cuando se observen los primeros ataques. Cuando el cultivo no sobrepase los 50 cm de altura usar la dosis menor.

* Tiempos de carencia:
Maíz grano 5
Maíz dulce 3

Información General:

Insecticida de amplio espectro a base de un piretroide (lambdacialotrina) y un fenil pirazol (fipronil), que actúa por contacto e ingestión (doble acción), presentando además un buen efecto residual. También tiene actividad ovicida y adulticida. Se caracteriza por su gran poder de volteo y por su protección persistente. Tratamiento de pre-cosecha: (cereales finos, arroz, maíz y sorgo) para facilitar la cosecha mecánica, debiendo el grano haber pasado el estado lechoso.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los plaguicidas utilizados comúnmente. No obstante, para mayor seguridad, es importante hacer pruebas en pequeña escala antes de realizar las mezclas.

Restricciones de uso: en caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

Las aplicaciones se realizan con equipos pulverizadores manuales y equipos terrestres provisto de un agitador mecánico o de una bomba que permita mantener una remoción constante a través del retorno, con barras provistas de pastillas de cono hueco o abanico plano, utilizando un volumen mínimo de agua de 80-100 l/ha y una presión de 40-50 lb/pulg2. Lograr una cobertura de 40 a 50 impactos/cm2 de 200 a 400 micrones para asegurar homogeneidad de distribución y con ello mayor residualidad por ingestión en días subsiguientes al tratamiento.
En papa utilizar pulverizadora de arrastre con un volumen de 400 l/ha de agua.
En cultivos frutales se aplica con equipos terrestres de alta presión a lanza o turbina. Se recomienda utilizar coadyuvantes para superar problemas de calidad de aguas del caldo de aplicación. Emplear la dosis mayor en superficies pubescentes o cerosas.

Además, se recomienda en todos los casos tener particular cuidado con la velocidad y dirección del viento en el momento de la aplicación, nunca aplicar con vientos mayores a 12 km/h y, con cualquier equipo de aplicación, lograr un diámetro de gota de 200-400 micrones.

Derrames:
En caso de derrames, cubrir el líquido derramado y contener el flujo del producto con tierra, arena o aserrín. Colocar el material de desecho en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (IRAC) + 3 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal, antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Producto formulado 3%+10%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 200-2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg

Primeros auxilios:
Inhalación: alejar a la persona afectada de la zona de trabajo. Colocar en un lugar bien ventilado y protegerla de la hipotermia. Si hay dificultad o molestias respiratorias suministrar oxígeno y llamar inmediatamente a un médico.
Contacto dérmico: retirar las ropas contaminadas y lavar las áreas de la piel afectadas con abundante agua y jabón
Contacto ocular: lavar inmediatamente con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. Si aparece irritación y persiste, consultar a un oculista.
Ingestión: no inducir al vómito dado que contiene solventes aromáticos. Dar primero 200 cm3 de aceite de parafina, seguido de lavado gástrico con 4 litros de agua y terminando con papilla de carbón activado y purgante salino no oleoso (sulfato de sodio: 30 g). Si hay convulsiones, el medicamento más adecuado es el DIAZEPAN endovenoso. Nunca suministrar nada por la boca a una persona que se encuentre inconsciente. Mantener al paciente en reposo hasta la llegada del médico.

Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda: dificultades respiratorias, mareos, trastornos digestivos, vómitos, reducción de reflejos, letargia, temblores y convulsiones.

Finalizada la aplicación es imprescindible lavar el equipo pulverizador reiteradas veces así como lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Muy tóxico

Evitar la contaminación de cursos de agua, agua de riego o de uso doméstico.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.