GLIFOSATO + 2,4D

Nomenclatura Química:
Glifosato: sal de dimetilamina de N-fosfonometilglicina
2,4 D: sal de dimetilamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fosfonometilglicina + ácido aril oxi alcanoico.
Acción: Sistemica

Uso: herbicida

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho	Especies anuales (gramíneas + latifoliadas)	3,00 – 6,00 lts/ha	15	Las dosis menores se utilizarán cuando la composición florística sea predominantemente graminoide y/o cuando las malezas se encuentren en sus primeros estadíos de desarrollo y en crecimiento activo. Las dosis mayores se utilizarán cuando la proporción de malezas latifoliadas sea alta, con malezas en estado de desarrollo mayor y/o en malezas que hayan sufrido estreses ambientales leves.
	Especies perennes	3,50 – 8,50 lts/ha		
	Sorgo/cañota	3,50 – 6,00 lts/ha (*)		
	Gramón, Gramilla, Cebollín, Junquillo, Pasto, Sunchillo	8,50 lts/ha		

(*) Dosis recomendada para Sorgo de Alepo no resistente a glifosato. Ante la probable aparición de biotipos resistentes, se recomienda consultar al asesor técnico sobre las combinaciones de productos a utilizar y métodos de manejo más recomendable.

Información General:

Es un herbicida total postemergente que puede ser utilizado en el control de malezas en barbechos, previo a la siembra de cualquier cultivo. Dada su escasa residualidad, puede realizarse la siembra del cultivo 15 días después de la aplicación. Posee acción sistémica, se absorbe por el follaje por lo que es importante que las malezas se encuentren en activo crecimiento en el momento de la aplicación. Luego se transporta a la parte aérea y a las raíces.

Instrucciones para el uso
Preparación: Se presenta formulado como un concentrado soluble, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado.
Para preparar una solución de aspersión debe llenarse el depósito con agua hasta la mitad, agregarle la dosis recomendada de la mezcla y completar el llenado. Debido a la alta solubilidad del herbicida, es suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Debe asperjarse con tamaños de gota gruesa a muy gruesa de la clasificación ASAE/ASABE S572.3:2020. Se sugiere emplear boquillas antideriva dentro del rango de presión especificada por el fabricante. Consulte el catálogo del fabricante de boquillas para asegurar que entregue un tamaño buscado. En caso de ser necesario, utilice surfactante.
Verifique que se obtiene la cantidad de gotas por centímetro cuadrado recomendado en la etiqueta (mínimo de 20 impactos/cm^2). Se sugiere aplicar un volumen de caldo de 90-120 L/ha, pero no menor a 70 L/ha, y velocidad de avance del pulverizador menor a 24 km/h.
Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, se sugiere no pulverizar cuando el viento sople hacia cultivos sensibles (*) adyacentes al lote a pulverizar, cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).
(*) Se consideran cultivos sensibles (girasol, algodón, poroto, soja no tolerante al 2,4 D, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y ornamentales en general, entre otros).

RESTRICCIONES DE USO
No aplicar si las malezas han sufrido estrés térmico o hídrico ya que esto determinará una menor eficacia del herbicida. Tampoco aplicar si las malezas están cubiertas con tierra o si se prevé una lluvia durante las 6 horas posteriores a la aplicación. Luego de la aplicación, esperar al menos 15 días para la siembra del cultivo. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 hs. después de aplicado el producto.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad:
Es recomendable no mezclar con herbicidas a base de sal potásica o monoamónica de Glifosato, ni agregar sulfato de amonio al caldo porque puede provocar precipitación del mismo. Siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad de agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.

Fitotoxicidad
Si se respetan los tiempos indicados en este marbete no hay problemas de fitotoxicidad en los cultivos subsiguientes. Se aconseja dejar un margen de por lo menos 15 días entre la aplicación del producto y la siembra del cultivo posterior, para evitar posibles daños de fitotoxicidad por residualidad en el suelo. Con condiciones ambientales y edáficas desfavorables para la actividad microbiana en el perfil (como bajas temperaturas, sequia, bajo contenido de materia orgánica y/o gran cantidad de rastrojo en superficie) este periodo debería ser aún mayor.

Derrames:
Aislar el área y negar la entrada a personas que no sean necesarias, manteniéndolas fuera. Utilizar los elementos de protección personal recomendados para este producto. Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor e identificarlo adecuadamente para su disposición final.
Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos.

Clasificación (modo o sitio de acción): 9 (HRAC) + 4 (HRAC)

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protector facial durante la preparación y/o aplicación.

Información Toxicológica:

Oral aguda en ratas LD50:	3129 mg/kg mg/kg.
Dermal aguda en ratas DL50:	> 5000 mg/kg de peso corporal.
Inhalación agudaCL50:	> 2,01 mg/L de aire.

Irritacion dermal:	No irritante
Irritacion ocular:	Moderado irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

RIESGOS AMBIENTALES:

abejas:	Virtualmente no tóxico para abejas.
aves:	Prácticamente no tóxico para aves.
organismos acuáticos:	Prácticamente no tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua con el agua del lavado de los equipos de aplicación.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.