# PROTHIOCONAZOLE

**Marcas comerciales**: CREATE PRO MAX SEMILLERO.

**Nomenclatura Química:**
prothioconazole: 3H-1,2,4-triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro
**Clasificación Química:** triazol.
**Acción:** de contacto y sistémica.

**Uso:** fungicida curasemillas.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|
| Soja | Alternaria (*Alternaria spp.)*<br>Antracnosis (*Colletotrichum spp.)*<br>Hongos del suelo (*Penicillium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)*<br>Hongos del suelo, Hongos de las semillas (*Rhizoctonia spp.)*<br>Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)*<br>Phomopsis (*Phomopsis sojae)*<br>Pythium (*Pythium spp.)* | 40 cm3 Create Pro Semillero(*) / 100 kg de semilla + 20 cm3 prothioconazole 30% / 100 kg de semilla | La aplicación debe ser realizada con antelación a la siembra. |
| Girasol | Alternaria (*Alternaria spp.)*<br>Hongos del suelo (*Penicillium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Mucor spp.)*<br>Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)*<br>Pythium (*Pythium spp.)* | 65 cm3 Create Pro Semillero(*) / 100 kg de semilla + 20 cm3 prothioconazole 30% / 100 kg de semilla | |
| Maíz | Alternaria (*Alternaria spp.)*<br>Hongos del suelo (*Penicillium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)*<br>Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)*<br>Pythium (*Pythium spp.)* | 33 cm3 Create Pro Semillero(*) / 100 kg de semilla + 17 cm3 prothioconazole 30% / 100 kg de semilla | |
| Maní | Hongos del suelo (*Penicillium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Fusarium spp.)*<br>Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)*<br>Hongos del suelo (*Rhizopus spp.)* | 40 cm3 Create Pro Semillero(*) / 100 kg de semilla + 20 cm3 prothioconazole 30% / 100 kg de semilla | |

**Información General:**

Prothioconazole actúa en forma preventiva, curativa y erradicante. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando tanto las enfermedades que son diseminadas vía semilla, como aquellas presentes en el suelo. El prothioconazole permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla provocan una disminución en el stand de plantas. Puede ser utilizado en forma preventiva y curativa

Técnicas y equipos de aplicación
Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemillas u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. Realizar el tratamiento al resguardo de los rayos solares. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, totalmente libre de tierra, polvo e impurezas y la incidencia de las enfermedades de semilla que se desean controlar, en ningún caso supere el 40%. Verificar fecha de vencimiento. Almacenar en lugares frescos (T° inferiores a 25°C). No exponer las semillas tratadas al sol.
.
Compatibilidad
Este producto se debe utilizar en mezcla con trifloxistrobin 7,69 % + metalaxyl 6,15 % a las dosis recomendadas

**Derrames:**
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 3 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protección respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

**Información Toxicológica:**

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda (rata): | DL50: > 5000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda (rata): | DL50: > 2000 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria aguda (rata): | CL50: 2,648 mg/l |
| | |
| Irritación dermal: | No irritante |
| Irritación ocular: | No irritante |
| Sensibilización dermal: | No sensibilizante |

Riesgos ambientales

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Ligeramente tóxico. No se espera exposición. |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico. |
| Toxicidad para peces: | Moderadamente tóxico. No se espera exposición. No contamine fuentes de agua. |

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATE PRO MAX SEMILLERO | BAYER | 36580 | FS | 30% | III |