# PROTHIOCONAZOLE + TRIFLOXISTROBIN

**Marcas comerciales**: CRIPTON.

**Nomenclatura Química:**
prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro
trifloxistrobin: metoximino -{2-[1(3-trifluorometil-fenil-)-etilidenamino- oximetil]-fenil}-metil éster del ácido acético
**Tipo de producto:** químico.
**Clasificación Química:** triazol + estrobilurina.
**Acción:** sistémica y mesostémica.

**Uso:** fungicida.

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Cebada<br>* | Escaldadura<br>(*Rhynchosporium secalis)*<br>Mancha borrosa<br>(*Bipolaris sorokiniana)*<br>Mancha en red<br>(*Drechslera teres)*<br>Ramularia o salpicado necrotico de la cebada<br>(*Ramularia collo-cygnis)*<br>Roya de la hoja<br>(*Puccinia hordei)* | 500-700 cm3/ha | 30 | Utilizar la dosis de 500 cm3/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones menores de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades.<br>Utilizar la dosis de 600 cm3/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones intermedias de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares moderadamente susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.<br>Utilizar la dosis de 700 cm3/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones altas de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades. |
| Trigo<br>* | Mancha amarilla<br>(*Drechslera tritici-repentis)*<br>Roya anaranjada<br>(*Puccinia recondita)*<br>Septoriosis de la hoja<br>(*Septoria tritici)* | | | Utilizar la dosis de 500 cm3/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones menores de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares más tolerantes y condiciones climáticas no tan favorables para el desarrollo de las enfermedades.<br>Utilizar la dosis de 600 cm3/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones intermedias de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas, cultivares moderadamente susceptibles y condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las enfermedades.<br>Utilizar la dosis de 700 cm3/ ha, en aquellos casos en que se presenten condiciones de presiones altas de enfermedades, aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas con condiciones de alto potencial de rendimiento, cultivares altamente susceptibles y condiciones climáticas muy favorables para el desarrollo de las enfermedades. |
| Soja<br>* | Mancha marrón<br>(*Septoria glycines*)<br>Mancha púrpura de la semilla<br>(*Cercospora kikuchii*) | 400 ml/ha | | Aplicar desde R3 (inicio de formación de vainas) y hasta R5.1 (inicio de formación de granos, perceptibles al tacto, hasta 10% de llenado de granos), cuando se observen los primeros sintomas en función a los umbrales existentes para cada enfernedad y con condiciones ambientales favorables para el desarrollo de las mismas. |
| Maní | Viruela tardía<br>(*Cercosporidium personatum)*<br>Viruela temprana<br>(*Cercospora arachidicola)* | 700 cm3/ha | 15 | Tratamiento foliar, aplicar al momento de las primeras manchas, repetir a los 28 días.<br><br>En años con condiciones predisponentes y alta presión de la plaga puede reducirse el intervalo entre aplicaciones. |
| Maíz | Roya común<br>(*Puccinia sorghi*)<br>Tizón foliar<br>(*Exserohilum turcicum*) | 600 a 700 ml/ha | 60 | El momento de aplicación depende de la aparición de cada una de las enfermedades y la ventana de aplicación en promedio es desde V8 a R1. |

*En trigo, cebada y soja: aplicar con 0,3 l/ha de Coadyuvante Optimizer en aplicaciones de caudales entre 100 y 150 l/ha. En caso de utilizar caudales de aplicación menores, utilizar el Coadyuvante Optimizer a razón del 0,2% en volumen.

*En trigo: no se recomienda aplicar en ausencia de síntomas. Se recomienda aplicar con 10% de incidencia en roya de la hoja y 30% de incidencia para manchas foliares.

*En cebada: no se recomienda aplicar en ausencia de síntomas y se aconseja utilizar el 30% de incidencia foliar a partir de fin de macollaje-encañazon como umbral.

*En maní: No se recomienda aplicar en mezclas con aceites y/o herbicidas que necesiten aceite en su aplicación.

*En maíz: Aplicar con coadyuvante aceite metilado de soja 0,5 L/ha en aplicaciones aéreas de caudales entre 20 y 25 L/ha, y 0,3 L/ha en aplicaciones terrestres de caudales entre 100 y 120 L/ha.

**Información General:**

Es un fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica, compuesto por los ingredientes activos trifloxistrobin y prothioconazole. Debido al modo de acción del trifloxistrobin y del prothioconazole, puede ser utilizado en forma preventiva y curativa.
Trifloxystrobin tiene una actividad mesostémica caracterizada por una afinidad con la superficie de la planta, una distribución por movimiento de vapor superficial y reubicación en la superficie vegetal, y una penetración del tejido con movimiento translaminar.

Trifloxystrobin es particularmente activo sobre la germinación de esporas y el crecimiento del micelio en la superficie de la planta. Inhibe también el desarrollo de patógenos, como la formación de haustorios en la epidermis del tejido vegetal.

Técnicas y equipos de aplicación
Puede ser aplicado con las pulverizadores convencionales de bajo volumen ya sean de arrastre o autopropulsadas siempre que estén provistas de un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo tal, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.
Es importante provocar un buen mojado de las plantas; para ello, se deben lograr aplicar entre 50 y 70 gotas /cm2; utilizando un volumen de agua orientativo que no debe ser menor a 150 l/ha de agua en aplicaciones terrestres.
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 15 km/h.
No está recomendada su utilización para aplicaciones aéreas.

Compatibilidad
En el cultivo de maní, bajo determinadas condiciones climáticas, y en mezclas de tanque con graminicidas y aceites, se pueden observar síntomas de fitotoxicidad, por lo que no se recomienda su mezcla. Diferir la mezcla en 2 días

**Derrames:**
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** 3 (FRAC) + 11 (FRAC).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Se recomienda utilizar guantes, ropa de protección adecuada, anteojos y protección respiratoria durante la preparación y/o aplicación.

**Información Toxicológica:**

| | |
|---|---|
| Toxicidad oral aguda(rata): | DL50 > 5000 mg/kg |
| Toxicidad dermal aguda(rata): | DL50 > 5050 mg/kg |
| Toxicidad inhalatoria aguda (rata): | CL50: > 2,31 mg/l |
| | |
| Irritación dermal: | No irritante |
| Irritación ocular: | Moderadamente irritante |
| Sensibilización dermal: | No sensibilizante |

Riesgos ambientales

| | |
|---|---|
| Toxicidad para abejas: | Virtualmente no tóxico |
| Toxicidad para aves: | Prácticamente no tóxico |
| Toxicidad para peces: | Prácticamente no tóxico |

No contaminar cursos ni espejos de agua.

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| CRIPTON | BAYER | 36374 | SC | 17,5% + 15% | IV |

**Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.**
**Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.**