CLORIMURÓN ETIL + SULFOMETURON METIL

Marcas comerciales: APPOINT - CANOPY STS - DEFENDER FUSION - LIGATE.

Nomenclatura Química:
clorimurón etil: (etil 2-[[[[(4-cloro-6-metoxipirimidin-2-il)amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato)
sulfometurón metil: metil-2 [[[[(4-6 di-metil-2 -pirimidinil)amino]carbonil]amino]sulfonil] benzoato
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: sulfonilurea.
Acción: residual.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Barbecho químico y Pre-siembra de Soja STS	Altamisa colorada (*Descurainia argentina)* Amor seco (*Bidens pilosa)* Anagallis (*Anagallis arvensis)* Apio cimarrón (*Ammi majus)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Borreria (*Borreria spp.- spermacoce spp.)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Capín (*Echinochloa colonum)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo (*Carduus acanthoides)* Cerraja (*Sonchus spp.)* Chloris (*Chloris spp.)* Eleusine (*Eleusine indica)* Flor de noche (*Oenothera indecora)* Gomphrena (*Gomphrena spp.)* Maíz guacho ***** (*Zea mays)* Malva blanca (*Sphaeralcea bonariensis)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Marcela (*Gnaphalium cheiranthifolium)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Ortiga (*Urtica urens)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pappophorum (*Pappophorum spp.)* Parietaria, Ocucha * (*Parietaria debilis)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto amargo ***** (*Digitaria insularis)* Peludilla (*Gamochaeta spicata)* Pensamiento silvestre ** (*Viola arvensis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra ***	90 - 100 g/ha + glifosato		Aplicaciones Barbecho Químico Largo: Aplicaciones hasta 100-120 días antes de la siembra. Barbecho Químico Corto: Aplicaciones hasta 30 -60 días antes de la siembra. Pre-siembra: Aplicaciones desde 7-10 días previos hasta la siembra.

	(*Conyza spp.)* Roseta (*Cenchrus pauciflorus)* Ryegrass (*Lolium multiflorum)* Urochloa (*Urochloa plantaginea)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado **** (*Amaranthus quitensis)*			

(*) Puede tener control parcial, dependiendo de las condiciones ambientales previas a la aplicación, estado de la maleza (emergida o no emergida), tipo de suelo, rastrojo, etc.
(**) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida, en estado de roseta de hasta 5-10 cm de diámetro, previo al estado de floración.
(***) Aplicar antes de la emergencia de la maleza o con la maleza emergida en estado de roseta de hasta 10 cm de diámetro, previo a la emisión de la vara floral.
(****) Control de biotipos susceptibles a herbicidas inhibidores de ALS.
(*****) Control pre-emergente de individuos provenientes de semillas dispersas.

Información General:

Herbicida de uso agrícola, para el control de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales/perennes en barbechos químicos y pre-siembra de lotes destinados a variedades de soja STS (tolerantes a sulfonilureas). Tiene además actividad residual que permite el control de muchas malezas que germinan después del tratamiento. (Comenzará a mostrar su acción herbicida residual una vez que haya ingresado en el suelo.)
Los efectos comienzan a notarse en un período de una a tres semanas después de la aplicación, dependiendo de las condiciones ambientales y grado de susceptibilidad de las malezas.

La efectividad es máxima cuando se aplica en pre-emergencia de las malezas o sobre plantas pequeñas, en activo crecimiento y cuando siguen al tratamiento buenas condiciones de humedad y temperatura. El grado de control y duración del efecto del producto dependen del espectro, tamaño, densidad de las malezas. Además, influyen también propiedades físicas y químicas del suelo, cantidad de lluvia caída, cobertura del suelo y condiciones ambientales previas y posteriores a la aplicación.

El producto está destinado para el control de malezas en barbechos químicos de lotes que rotan exclusivamente con sojas STS. En la secuencia de rotación que sigue a la soja STS pueden sembrarse los siguientes cultivos: trigo, cebada, avena, maíz, girasol, sorgo, soja. En cada caso deben observarse los siguientes períodos mínimos desde la aplicación del producto y la siembra: trigo, cebada, avena, soja (7 meses), maíz, girasol, sorgo (11 meses).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre provisto con un agitador mecánico adecuado, o con una bomba capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno. Deberán emplearse pastillas de abanico plano. Número de gotas: aplicar 30-40 gotas/cm2 (gotas de 300 a 500 micrones).
Se recomienda respetar el orden de preparación indicado en la etiqueta. Preparar únicamente el producto estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.
Debe ser aplicado en mezcla de tanque con glifosato para el control de las malezas presentes al momento del tratamiento.

Se recomienda aplicar preferentemente en pre-emergencia de la maleza o con maleza emergida pequeña en estado vegetativo (rosetas de 5-10 cm máximo, en el caso de latifoliadas, o 2-3 hojas en el caso de gramíneas). En el caso de maíz guacho, el control es básicamente de pre-emergencia de individuos provenientes de semillas dispersas.

Aplicar con buenas condiciones de humedad que permitan el activo crecimiento de las malezas. No aplicar cuando las malezas estén bajo situaciones de estrés tales como sequía, bajas temperaturas o heladas, baja fertilidad, etc. porque el control puede ser deficiente y el cultivo puede resultar afectado. En aplicaciones otoño-invernales el control puede extenderse aproximadamente a 100-150 días, dependiendo de las temperaturas, condiciones físico químicas del suelo, régimen de lluvias, etc. En aplicaciones primaverales el período de control se extiende 60-90 días dependiendo también de las variables mencionadas anteriormente.

Eliminar el caldo en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas, sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas, ni pastoreadas, alejadas de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos. Es importante para evitar el arrastre de producto remanente en tanque a un cultivo susceptible
ADVERTENCIAS
- No aplicar en otra circunstancia distinta de las expresamente indicadas en las recomendaciones de uso.
- No aplicar en suelos con pH superiores a 7 ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que sigan en la rotación.
- En aplicaciones de pre-emergencia, luego de la emergencia del cultivo, no aplicar insecticidas órgano-fosforados por un lapso de 14 días desde la aplicación, ya que el cultivo puede ser dañado.
- No utilizar en lotes con suelos arenosos (conteniendo más de 50% de arena), y materia orgánica menor a 1%, cualquiera sea la rotación siguiente a la soja.
- Resiembras: en caso de necesidad de resiembra en la soja siguiente a la aplicación, deberá utilizarse una variedad de soja STS.
- Máximo número de aplicaciones: no realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo.

Período de carencia: exento (uso posicionado previo a la implantación del cultivo).
En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia
Rotación de cultivos.

Tiempo de reingreso al área tratada: dejar transcurrir 12 horas después de la aplicación para ingresar al área tratada. En caso de necesitar hacerlo con anticipación, realizar el ingreso con el equipo de protección personal adecuado.

Compatibilidad: Es incompatible con insecticidas producto de fuerte reacción alcalina. Es compatible con glifosato en sus formulaciones mas frecuentes.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico para la soja STS® a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Contener y absorber el producto derramado con material inerte (tierra, arena o aserrín). Barrer y recoger el mismo en bolsas o recipientes correctamente rotulados para su posterior destrucción por empresas autorizadas para tal fin. Lavar con abundante agua y jabón el área contaminada. Evitar que el derrame contamine aguas de riego y/o de uso doméstico. En caso de que esto ocurra, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (HRAC) + 2 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Preparación y aplicación: barbijo, antiparras, guantes de goma de nitrilo impermeables, camisa de mangas largas y pantalones, gorra con protección para la nuca y botas de goma.

Información Toxicológica:

Información del producto formulado:

Toxicidad oral aguda(rata):	DL 50 > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda(rata):	DL 50 > 2273 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda(rata):	DL 50 > 5.06 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático. No presenta advertencias toxicológicas especiales.
No inducir al vómito y no suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces y crustáceos:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para algas acuáticas:	Extremadamente tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
APPOINT	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40428	WG	20% + 15%	IV
CANOPY STS	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	41092	WG	20% + 15%	IV
DEFENDER FUSION	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	40179	WG	20% + 15%	IV
LIGATE	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	36831	WG	20% + 15%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.