BOSCALID

Marcas comerciales: CANTUS.

Nomenclatura Química:
boscalid: 2-cloro-N-(4'clorobifenil-2-il)-nicotinamida
Clasificación Química: carboxamida.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arándano	Alternaria (*Alternaria spp.)* Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	1 kg/ha (volumen de agua 500 l/ha)	7	Aplicar preventivamente y ante condiciones climáticas predisponentes a las enfermedades. Es importante considerar susceptibilidad varietal. Trabajar bajo esquema de monitoreo "MIE". Se recomienda no realizar más de 1 aplicación por temporada.
Vid	Podredumbre gris (*Botrytis cinerea)*	1,2 kg/ha	5	Aplicar en períodos críticos como flor, envero o pre-cosecha, alterándolo con otro botriticida de diferente modo de acción. También puede ser aplicado al aparecer los primeros síntomas de la enfermedad en los racimos, rotándolo con fungicidas de otro modo de acción. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por temporada.

Información General:

Es un fungicida perteneciente al grupo químico de las carboxamidas a base del principio activo boscalid, recomendado para el control de Botrytis (Botrytis cinerea) en vid, Alternaria (Alternaria spp.) y Botrytis (Botrytis cinerea) en arándano. Posee un modo de acción sistémico local y translaminar, con efecto preventivo y curativo. Actúa por inhibición de la germinación de esporas, la elongación del tubo germinativo, el crecimiento micelial y la esporulación. Esta acción múltiple es consecuencia de la inhibición de la enzima succinato ubiquinona reductasa, lo cual bloquea el Complejo II de la cadena respiratoria en la membrana mitocondrial, otorgando una doble actividad fungicida al interferir en el transporte de electrones para la formación de ATP y la formación de los componentes de lípidos y aminoácidos del hongo. Como una práctica general de manejo de resistencia de hongos a fungicidas, se recomienda la rotación con fungicidas registrados, con distinto modo de acción.

Preparación de la solución
Debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego, con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de boscalid al tanque del pulverizador SIN necesidad de agregar coadyuvantes. Completar el tanque con agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.

Equipos y técnicas de aplicación
En el cultivo de vid se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo.
En el cultivo de arándano: Se recomienda la aplicación con mochilas de presión manual o pulverizadoras de alto volumen, de gota transportada por turbina, en función del tamaño de las plantas. El mojado debe ser completo, asegurando la entrada de las gotas al interior de la canopia. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 200 a 1000 litros por hectárea. Se recomienda ajustar por TVR. El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s.

Compatibilidad
Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de vid. Para mezclas específicas consultar con el departamento técnico de la empresa correspondiente.

Derrames:
Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado. No utilizar containers de aluminio ni de acero sin costuras. Posteriormente vierta agua sobre el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material absorbente como arcilla, aserrín o material específico para derrames y colocarlo en el mismo container cerrado con el resto del producto derramado.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: > 2000 mg/kg

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
CANTUS	BASF ARGENTINA	37075	WG	50%	III