AMETOCTRADIN + DIMETOMORF

Marcas comerciales: ZAMPRO DM.

Nomenclatura Química:
ametoctradin: 5 ethyl-6-octyl [1,2,4] triazol [1,5-a] pyrimidin-7-amine
dimetomorf: (E,Z) 4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil) acriloil]morfolina
Clasificación Química: ditiocarbamato + ácido cinámico.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1-1,2 l/ha con intervalo de 7 días	7	Preventivo. A partir de que haya condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración y hasta el final del cultivo si fuera necesario. Cuando las condiciones climáticas sean muy favorables para la aparición de las enfermedades se recomienda disminuir el intervalo de aplicación y aplicar la mayor dosis.
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	Aplicación foliar: 120 cm3/hl	1	Preventivo. A partir de que haya condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración y hasta el final del cultivo si fuera necesario. Se recomienda no realizar más de dos aplicaciones por temporada.

Información General:

Es un fungicida recomendado para el control del tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans) y de la peronóspora de la vid (Plasmopara viticola) que combina control preventivo y curativo con largo efecto residual. Tiene dos ingredientes activos que se complementan uno al otro entregando protección contra todas las fases del ciclo de vida del hongo. Acción preventiva con actividad protectora dada por el principio activo ametoctradin y acción sistémica, preventiva y curativa del dimetomorf. Ametoctradin pertenece a una nueva familia química de fungicidas denominada triazolopirimidinas. Es un potente inhibidor del complejo III, que actúa bloqueando una enzima de la cadena respiratoria mitocondrial en los patógenos oomicetes, causando una rápida pérdida en los niveles de ATP celular y muerte del hongo. Ametoctradin es un fungicida protector que se adhiere a la capa cerosa de la superficie de la hoja y forma un depósito para ejercer una acción preventiva de largo plazo y un rápido control de las zoosporas de oomicetes, interrumpiendo así el ciclo reproductivo del patógeno. El principio activo dimetomorf actúa por interrupción de la formación de la pared celular de los hongos, interfiere en el normal crecimiento del hongo y puede llevar a lisis de la pared celular y muerte de las células. La actividad antiesporulante del dimetomorf disminuye notablemente el potencial de diseminación de la infección. Este fungicida es indicado para programas de manejo de resistencia ya que sus ingredientes activos, no tienen resistencia cruzada entre ellos y con la mayoría de los fungicidas comúnmente utilizados en el control de esta enfermedad. Para el del tizón tardío de la de papa (Phytophthora infestans) y de la peronóspora de la vid (Plasmopara viticola), se recomienda aplicar la aplicación foliar de amectotradin + dimetomorf en la etapa de floración-tuberización en un programa de rotación con otros fungicidas registrados con distinto modo de acción.

Derrames:
Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado en hornos apropiados. Posteriormente lavar con abundante agua el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material absorbente como arcilla o aserrín y colocarlo en el mismo contenedor cerrado con el resto del producto derramado.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 500 < 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5,1 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Ligeramente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.

ZAMPRO DM	BASF ARGENTINA	36836	SC	30% + 22,5%	II