MESORHIZOBIUM CICERI

Marcas comerciales: ADHERE GARBANZO - RIZO-LIQ TOP GARBANZO - RIZOPACK GARBANZO 213 - SIGNUM GARBANZO.

Nomenclatura Química:
Mesorhizobium ciceri
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: inoculante (en turba).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Garbanzo	1,2 kg / 982 kg de semilla	Sembrar la semilla inoculada dentro de 4 a 6 horas de realizado el tratamiento.

Información General:

ADHERE GARBANZO es un inoculante sólido en turba esterilizada con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno, que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima la producción del cultivo de garbanzo.

Aplicación
Después de abrir el paquete, desmenuzar suavemente con los dedos para dispersar el contenido. El agregado de agua en el momento de la aplicación optimizará la actividad del adhesivo integral para brindar una cobertura uniforme del inoculante sobre la semilla.

Aplicación en forma de slurry o pasta lechosa
Agregar todo el contenido del paquete a aproximadamente 2 litros de agua limpia y declorinada y revolver bien en un recipiente limpio hasta formar un slurry o pasta lechosa libre de grumos. Sin dejar decantar el slurry, verter sobre la semilla y mezclar a fondo para asegurar una cobertura uniforme de la misma. Permitir que la semilla seque antes de seguir manipulándola.

Inoculación húmeda
Aplicar sólo el agua necesaria para humedecer levemente la semilla (2 cm3/kg). Mezclar a fondo la semilla húmeda con el inoculante hasta conseguir una cobertura uniforme de la misma.

Inoculación en seco
Verter la cantidad correcta de inoculante sobre capas delgadas de semilla en la tolva de la sembradora y mezclar a fondo para cubrir la semilla uniformemente. Para sistemas de manejo de semilla a granel, el inoculante puede dosificarse directamente a la semilla en el sinfín del chimango.

Compatibilidad con tratamientos de semillas
ADHERE GARBANZO es compatible con la mayoría de los tratamientos de semilla cuando está seco. Este inoculante también puede aplicarse a cualquier semilla específica tratada cuando está húmedo (solicite detalles al distribuidor/fabricante). Respetar las recomendaciones sobre épocas de siembra para lograr la respuesta óptima.

Almacenamiento/Precauciones
Almacenar este producto por debajo de 20ºC y lejos de la luz solar directa.
Mantener el inoculante y la semilla inoculada en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa y sembrar lo antes posible.
No utilizar inoculante vencido o almacenado incorrectamente.
Se recomienda sembrar la semilla dentro de las 4 a 6 horas de la inoculación. De no sembrarse dentro de las 24 horas, la semilla deberá volver a inocularse.
Si la semilla tuviera bajo contenido de humedad, se recomienda usar el método de slurry o bien el de aplicación húmeda.

Uso: inoculante (líquido).

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Garbanzo	No aplica	200 cm3/50 kg (Rizo-Liq Top Garbanzo) 200 cm3/50 kg (Signum Garbanzo)	Siembra inmediatamente de realizado el tratamiento.
	Damping off y enfermedades de las raices (*Fusarium spp.; Rhizoctonia spp*) Damping off y enfermedades de las raices (*Pythium spp.; Penicillium spp)* Hongos de la semilla (*Alternaria spp.; aspergillus spp)* Hongos de la semilla (*Ascochyta rabiei; rhizopus spp)*	400 mL RIZOLIQ TOP GARBANZO + 100 mL PREMAX + 100 mL MAXIM EVOLUTION (TIABENDAZOL + FLUDIOXONIL + METALAXIL-M) / 100Kg de semilla	

Información General:

El inoculante Rizo-Liq Top Garabnzo está elaborado con cepas seleccionas especialmente de bacterias fijadoras de nitrógeno. Este producto contiene a la elaboración 1 x 10 exp9 bacterias/cm3, y a su vencimiento 1 x 10 exp8 bacterias/cm3, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

Signum Garbanzo es un bio-preparado que actúa como un generador de señales moleculares que activan de manera temprana procesos metabólicos en las bacterias y en las plantas, asegurando una simbiosis exitosa.
Signum Garbanzo mejora la tolerancia del cultivo de garbanzo frente a diferentes condiciones de estrés, como ser el déficit hídrico, las bajas temperaturas o la acidez de los suelos.

Signum Garbanzo está elaborado con cepas de bacterias especialmente seleccionas por su capacidad de fijación de nitrógeno. Contiene 1 x 10 exp9 bacterias/cm3, y a su vencimiento 1 x 10 exp8 bacterias/cm3 a su vencimiento, cuando el producto se almacena en las condiciones recomendadas.

Aplicación
En condiciones de sombra mezclar el producto con las semillas en las dosis indicadas hasta la obtención de una cobertura uniforme. Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra. Deben sembrarse las semillas dentro de las 24 horas posteriores a su tratamiento. En caso de usar insecticidas o fungicidas, los mismos deberán aplicarse primero y posteriormente este inoculante.
Precauciones
- Evitar altas temperaturas, superiores a 25 ºC.
- No exponer a los rayos solares.

Almacenamiento
- Si se conserva en heladera debe colocarse lejos del congelador o freezer.
- Respete la fecha de vencimiento.
- Una vez abierto pierde su condición de esterilidad.
- Debe almacenarse en lugares frescos, a la sombra, con temperaturas inferiores a 25°C.
- NO dejar expuesto a la acción directa del sol.

Derrames:
Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos domiciliarios.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico.
Riesgos ambientales: no tiene

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.	C.T.
ADHERE GARBANZO	BASF ARGENTINA	21007	TURBA	2x10 exp10 bact/g	No aplica
RIZO-LIQ TOP GARBANZO	RIZOBACTER ARGENTINA	21085	LÍQUIDO ACUOSO	1 x 10 exp9 bact/cm3	No aplica
RIZOPACK GARBANZO 213	RIZOBACTER ARGENTINA	206	FS + AL	1 x 10 exp9 bact/cm3 + 30,2% + 15% + 2,5% + 2%	III
SIGNUM GARBANZO	RIZOBACTER ARGENTINA	EXP. 92211	LÍQUIDO ACUOSO	1 x 10 exp9 bact/cm3	No aplica