BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM + IPCONAZOLE + METALAXIL

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium japonicum
Ipconazole: (1RS, 2SR, 5RS) (1RS, 2SR, 5SR)-2-(4-Chlorobenzyl)-5-Isopropyl-1-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl) cyclopentanol
Metalaxil: methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.) + triazol + acilalanina.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas, fungicida e inoculante.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Complejo de hongos del suelo o Damping-off (*Phytium spp.)* Hongos del suelo (*Penicillium spp.)* Hongos del suelo (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo (*Rhizoctonia spp.)* Hongos del suelo (*Phomopsis spp.)* Hongos del suelo (*Cercospora kikuchii)*	Fungicida: 75 cm3/100 kg de semilla Inoculante: 200 cm3/ 100 kg de semilla Concentración por gramo de producto: 5 x 109 bact/cm3 a la fecha de fabricación y no menos de 5 x 108 bact/cm3 a la fecha de vencimiento.	Previo a la siembra.

Información General:

Inoculante: Elaborado con cepas seleccionadas especialmente de bacterias fijadoras de nitrógeno. Aplicando este inoculante de acuerdo a las instrucciones enunciadas, proporciona no menos de 80.000 bacterias viables específicas por semilla,. A la elaboración contiene 5x109 bacterias viables/cm3 de inoculante. A vencimiento contiene 1x108 bacterias viables/cm3 de inoculante cuando el producto se almacena en condiciones refrigeradas.

Fungicida: Tiene acción sistémica y de contacto logrando un excelente control de un amplio espectro de enfermedades diseminadas por las semillas como así también de hongos presentes en el suelo.

El Pack contiene la cantidad necesaria para tratar 2600 kg de semilla de soja. Almacenar en lugar fresco y a la sombra, con temperaturas inferiores a 25°C. Agitar ambos productos antes de usar.
1) Agregar 75 cm3 de fungicida por cada 100 kg de semilla de soja con anterioridad a la aplicación del inoculante. El volumen a utilizar para 100 kg de semilla incluyendo la dosis de Bradyrhizobium japonicum + ipconazole + metalaxil más agua, deberá ser 500 cm3. Mezclar uniformemente.
2) Agregar 200 cm3 de inoculante por cada 100 kg de semilla de soja en un momento próximo a la siembra (las semillas deben ser sembradas dentro de las 24 hs posteriores al tratamiento). Mezclar uniformemente.

Es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semillas. Con ellos se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se disponga de este tipo de equipamiento puede utilizarse un tambor rotativo de eje excéntrico u otro sistema rotativo de aplicación. Debe tenerse en cuenta que la distribución homogénea del producto es fundamental para la obtención de un resultado satisfactorio.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico. Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica + 3 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Protector facial, protección respiratoria, guantes de goma de nitrilo y botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos.

Información Toxicológica:

DL50 oral aguda: > 3000 mg/kg de peso
DL50 dermal aguda: > 4000 mg/kg de peso

Primeros auxilios: por salpicaduras en ojos lavar con abundante agua limpia por 15 minutos.
En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

En caso de ingestión accidental enjuagar la boca y beber abundante agua.
En todos los casos LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

Riesgos ambientales:
Toxicidad en abejas: virtualmente no tóxico. Uso posicionado.
Toxicidad para peces: ligeramente tóxico.
Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico.

Advertencia para el médico: aplicar tratamiento sintomático.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.