Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

MESORHIZOBIUM CICERI + FLUDIOXINIL + METALAXIL - M

Marcas comerciales: RIZOPACK GARBANZO 202 (*).

Nomenclatura Química:
Mesorhizobium ciceri.
fluodioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil M: N-(2-6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil ester
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.) + fenilpirrol + acilalanina.
Acción: de contacto, sistémica y promotor biológico del crecimiento vegetal.

Uso: curasemillas e inoculante.

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Garbanzo	8 l (Rizo Liq Top Garbanzo) + 2 l(Maxim XL) cada 2.000 kg	Siembra inmediatamente de realizado el tratamiento.

Información General:

Este producto contiene un inoculante líquido Rizo Liq Top Garbanzo y un curasemillas fungicida (Maxim XL).
Mezclar el contenido de 4 vejigas de Rizo Liq Top Garbanzo (4 litros) con el contenido de 1 botella de (Maxim XL (1 l) en un balde limpio. Revolver durante algunos segundos hasta alcanzar una mezcla uniforme.
Proceder a inocular la semilla en forma inmediata.
Aplicar la totalidad de esta mezcla (5 l) a 1000 kg de semilla, o su equivalente de 250 cm3 cada 50 kg.

Derrames:
Se trata de hacer una mezcla de vejigas del inoculante con el fungicida Maxim XL y se debe en el caso de derrame de la mezcla, detenerlo con aserrín, viruta de madera o arena, recoger y luego hacer gestión de residuos especiales según legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica + 12 (FRAC) + 4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, protección respiratoria adecuada, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas y delantal durante la aplicación.

Información Toxicológica:

Productos no tóxicos (Rizo Liq Top Garbanzo)

Para el producto formulado Maxim XL (2,5% + 1%)
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50:

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: No irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para org acuáticos: Muy tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
RIZOPACK GARBANZO 202 (*)	RIZOBACTER ARGENTINA	21085 y 33356	AL + FS	(1x10 EXP9 bact/cm3) + (1% + 2,5%)

* RIZO-LIQ TOP GARBANZO + MAXIM XL