NOVALURON + ACETAMIPRID

Marcas comerciales: ADAMA CORMORAN.

Nomenclatura Química:
novaluron: 1-(3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-triflurometoxietoxi)fenil)-3-(2,6-difluoro benzoil)urea
acetamiprid: (E)-N1-[(6-cloro-3piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina
Clasificación Química: benzolfenilureas + neonicotinoide.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Manzanas	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	50 - 70 cm3/hl	35	Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien a los planes de cura previamente establecidos. Con la dosis de 50 cm3/hl se logra una protección de 14 días y con la dosis de 70 cm3/hl se logra una protección de 21 días.
	Chicharrita o Cotorrita (*Edwardsiana crataegi)*	50 cm3/hl		Aplicar el producto al observar presencia de ninfas en 5% de hojas.
	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*	70 cm3/hl		Aplicar al observar la eclosión de las ninfas móviles. En general corresponden a dos épocas: primavera y en marzo-abril.
	Pulgón verde del manzano (*Aphis pomi)*	50 cm3/hl		Aplicar al detectar la plaga.
Peras	Carpocapsa (*Cydia pomonella)*	50 - 70 cm3/hl		Realizar los tratamientos de acuerdo al servicio de alarma o bien a los planes de cura previamente establecidos. Con la dosis de 50 cm3/hl se logra una protección de 14 días y con la dosis de 70 cm3/hl se logra una protección de 21 días.
	Cochinilla (*Planococcus spp.)*	70 cm3/hl		Aplicar con un buen cubrimiento cuando se detecte la plaga a caída de pétalos y muñeca separada.
	Psílido del peral (*Cacopsylla pyricola)*	50 cm3/hl		Aplicar el producto al observar la presencia de las primeras ninfas y sea evidente la producción de melaza.

Es recomendable implementar un cuidadoso monitoreo de la plaga y seguir los métodos de monitoreo recomendados en cada región para decidir el momento correcto de la aplicación y obtener la mejor eficacia del producto, siempre procediendo de acuerdo a las instrucciones de uso siguiendo las buenas prácticas agrícolas.

Información General:

Insecticida que contiene los ingredientes activos novaluron y acetamiprid. Novaluron pertenece al grupo de las benzoilfenil ureas, que se caracteriza por inhibir la formación de quitina y producir la muerte de los insectos al momento de la muda. Desde que el insecto toma contacto con el producto disminuye el daño (deja de comer) pudiendo transcurrir 2 ó 3 días hasta que se produzca la muerte. Es un larvicida que actúa por ingestión. También actúa por contacto como ovicida y supresor de la fecundidad en hembras adultas. Acetamiprid es un insecticida de la familia de las nitroguanidinas (neonicotinoide), sistémico y translaminar y es absorbido muy bien por el follaje; con una acción rápida y de efecto residual prolongado; actúa sobre los organismos nocivos por ingestión y por contacto. Tiene un mecanismo de acción sobre el sistema nervioso central de los insectos, actuando como un análogo de la acetilcolina (Ach) que es un transmisor químico natural de impulsos. Su mecanismo de acción consiste en que ataca una proteína receptora de la acetilcolina (Ach) en membrana de post-sinapsis.
Producto adecuado para ser incorporado a los sistemas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Es fundamental observar las instrucciones de uso con lo que se obtendrán los mejores resultados.

PREPARACION:
Cargar el equipo con agua hasta la mitad de su capacidad y luego agregar el producto. Posteriormente completar la carga con agua. Los agitadores mecánicos deberán mantenerse en funcionamiento durante la preparación y aplicación. Cuando se aplique en mezcla es recomendable realizar una prueba previa con pequeñas cantidades para evaluar la estabilidad de la mezcla.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION:
Para conseguir un efectivo control cuidar que la pulverización llegue al interior de las plantas, incluso ramas y troncos, trabajando con altos volúmenes y alta presión, hasta unto de goteo. Se debe lograr un buen mojado del follaje y/o de los frutos.
Utilizar volúmenes de agua no inferiores a 2000 litros de agua por hectárea, dependiendo del tamaño de los árboles.
Utilizar pulverizadores de alto o bajo volumen (máquinas moto-pulverizadoras o de arrastre) provistas de agitadores.

Compatibilidad:
Puede aplicarse sin inconveniente alguno en mezcla de tanque con insecticidas y fungicidas neutros. No se debe mezclar con ácido fosfórico. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >300 <2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: 1,61-1,7 mg/l
Irritación dermal:	No irritante
Irritación ocular:	Irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante
Riesgos ambientales	
Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA CORMORAN	ADAMA ARGENTINA SA	36772	EC	10% + 8%	II