CLOROTALONIL + DIMETOMORF

Marcas comerciales: ADAMA SPHINX SUPRA.

Nomenclatura Química:
clorotalonil: Tetracloro isoftalonitrilo
dimetomorf: (E,Z)4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acrilonil]morfolina
Clasificación Química: cloronitrilo + ácido cinámico.
Acción: de contacto, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1, 25 kg/ha	7	Aplicar el producto en forma preventiva a partir de que haya condiciones predisponentes para la aparición de la enfermedad, o desde floración. Se recomiendan pulverizaciones preventivas con intervalo de 7 días.

Información General:

Fungicida recomendado para el control del tizón tardío de la papa (Phytophtora infestans); combina la acción de dos principios activos, clorotalonil y dimetomorf. Posee acción preventiva y antiesporulante. En las aplicaciones foliares el dimetomorf es absorbido por la hoja y es traslocado dentro de la misma (movimiento translaminar). Por su parte, el clorotalonil es un fungicida protector que permite ampliar el rango de acción contra diferentes hongos y por ser fungicida de diferente modo de acción que el dimetomorf, contribuye a evitar la aparición de razas resistentes.
PREPARACIÓN:
Agregar en la cantidad determinada por la dosis a utilizar, mientras se va cargando con agua el tanque del equipo. Los agitadores mecánicos y el retorno deberán mantenerse en funcionamiento durante la preparación y aplicación.
Cuando se aplique en mezcla, en todos los casos agregar primero clorotalonil + dimetomorf en el agua y luego agregar a la dilución el otro pesticida. Es recomendable realizar una prueba previa con pequeñas cantidades para evaluar la estabilidad de la mezcla.
EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:
Debe ser aplicado con pulverizadoras de arrastre o tres puntos equipadas con barra y botalón con o sin caños de bajada (dependiendo del tamaño del cultivo) y utilizar picos tipo cono hueco, de manera de cubrir totalmente el follaje del cultivo. La buena cobertura del follaje es esencial al aplicar el producto.
Volumen: 250 litros/ha, se debe lograr 50 a 70 gotas/cm2, a una presión de 40 lb/pulg2.

Derrames:
En caso de derrames, cubra con tierra o arena, recoja el producto con una pala y coloque los desechos en bolsas identificadas para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin. Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
Toxicidad oral aguda: DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda: DL50: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda: CL50: >0,37 mg/l NOCIVO. Clase II.

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Prácticamente no irritante
Sensibilización dermal: No sensibilizante

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Muy tóxico

No contaminar alimentos, forrajes, ni cursos de agua. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ADAMA SPHINX SUPRA	ADAMA ARGENTINA SA	36832	WG	40% + 8%	III