AMETOCTRADIN + METIRAM

Marcas comerciales: ORVEGO ME.

Nomenclatura Química:
metiram(complejo): polímero tris[amino[etilenebis(ditiocarbamato)] zinc (2+)][tetrahydro-1,2,4,7-dithiadiazocine-3,8-ditione]
Coprecipitado de zineb y disulfuro de propilenbistio-carbamoilo
ametoctradin: 5 ethyl-6-octyl [1,2,4] triazol [1,5-a] pyrimidin-7-amine
Clasificación Química: triazolpirimidina + ditiocarbamato.
Acción: de contacto.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Vid	Peronóspora (*Plasmopara viticola)*	Aplicación foliar: 250 g/hl	3	Se recomiendan aplicaciones preventivas desde 10 cm de brotes, repetir bajo condiciones predisponentes. Se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones por temporada.
Papa	Tizón tardío de la papa (*Phytophthora infestans)*	1,5+2 kg/ha	7	Preventivo: deberá iniciarse el tratamiento cuando las plantas tengan 15-20 cm de altura. Aplicar en forma preventiva cada 7 días. Cuando las condiciones climáticas sean muy favorables para la aparición de las enfermedades se recomienda reducir el intervalo entre aplicaciones y trabajar con la mayor dosis. Mojar bien el follaje.

Información General:

Es un fungicida recomendado para el control preventivo del tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans) y de la peronóspora de la vid (Plasmopara viticola), combina la acción de dos principios activos, ametoctradin y metiram que proporcionan un largo periodo protectivo. Ametoctradin pertenece a una nueva familia química de fungicidas denominada triazolopirimidinas. Es un potente inhibidor del complejo III, que actúa bloqueando una enzima de la cadena respiratoria mitocondrial en los patógenos oomicetes, causando una rápida pérdida en los niveles de ATP celular y muerte del hongo. Ametoctradin es un fungicida protector que se adhiere a la capa cerosa de la superficie de la hoja y forma un depósito para ejercer una acción preventiva de largo plazo y un rápido control de las zoosporas de oomicetes, interrumpiendo así el ciclo reproductivo del patógeno. El principio activo metiram es un fungicida que actúa por contacto, ejerciendo su acción principal de forma preventiva, inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo de los tubos germinativos. Metiram es un inhibidor enzimático múltiple, que interfiere en más de una posición las enzimas de las células de los hongos; debido a su modo de acción "multi-sitio" es improbable el desarrollo de resistencias.
Está indicado para programas de manejo de resistencia ya que sus ingredientes activos, no tienen resistencia cruzada entre ellos y con la mayoría de los fungicidas comúnmente utilizados en el control de estas enfermedades. Para el del Tizón tardío de la de papa (Phytophthora infestans) y de la peronóspora de la vid (Plasmopara vitícola), se recomienda la aplicación foliar preventiva cada 7 días desde que las plantas tengan 15-20 cm de altura y también después de las lluvias dentro de un programa de rotación con otros fungicidas registrados con distinto modo de acción.

Derrames:
Barrer el material derramado y colocarlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior incinerado en hornos apropiados. Posteriormente lavar con abundante agua el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas. Absorber el líquido de enjuague con material adsorbente como arcilla o aserrín y colocarlo en el mismo contenedor cerrado con el resto del producto derramado.

Clasificación (modo o sitio de acción): M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Mascara, guantes de nitrilo, ropa de trabajo tipo Tyvek, botas de goma, lentes de seguridad.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL 50: > 5,5 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Moderado irritante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Moderadamente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ORVEGO ME	BASF ARGENTINA	37108	WG	12% + 44%	III