AZOXISTROBINA + TEBUCONAZOLE + PROCLORAZ

Nomenclatura Química:
azoxistrobina: [methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate]
tebuconazole: alfa -[2-(4 clrofenil)etil)-alfa(1-1 dimetiletil)- 1 H -1,2,4triazol-1-etanol
procloraz: 1-N-propil-N-[2(2,4,6-triclorofenoxi)etil]carbamoil imidazol
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: estrobilurina + triazol + imidazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja de la cebada (*Puccinia hordei)*	1250 cm3/ha	35	Comenzar la aplicación al observar los primeros signos de la enfermedad.
Trigo	Fusariosis (*Fusarium graminearum)*			Aplicar en forma preventiva o con baja incidencia de la enfermedad, a comienzos de antesis, cuando las condiciones ambientales sean predisponentes en variedades susceptibles, el retraso de la toma de decisiones redunda en menor control.
	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Septoriosis de la hoja (*Septoria tritici)*			Aplicar ante un 45% de incidencia o preventivamente ante la presencia de condiciones predisponentes a la enfermedad (elevada humedad ambiente, lluvias y elevada temperatura).
	Roya de la hoja (*Puccinia recondita)*			Aplicar ante un 10% de incidencia (10 hojas con al menos una mancha en un total de 100 hojas) o preventivamente ante la presencia de condiciones predisponentes a la enfermedad (elevada humedad ambiente, lluvias y elevada temperatura).

Información General:

Fungicida sistémico y de contacto con efectos preventivos, curativos y erradicantes. Su modo de acción se basa en la combinación de sus tres principios activos: azoxistrobina, tebuconazole y procloraz.
El primero, la azoxistrobina, perteneciente al grupo de las estrobilurinas, actúa inhibiendo el proceso respiratorio de los hongos, resultando especialmente eficaz para impedir la germinación de esporas y el desarrollo inicial del patógeno.
Los otros dos, tebuconazole y procloraz, inhiben la biosíntesis del ergosterol del hongo parásito de la planta huésped, impidiendo la formación de su membrana y por ende la multiplicación del hongo. Además, la azoxistrobina posee actividad translaminar, otorgando una mejor eficacia en cultivos densos. En consecuencia, el producto presenta una prolongada residualidad que asegura la protección de las hojas, retardando la senescencia y manteniéndolas verdes por más tiempo, favoreciendo el llenado de granos.

Recomendaciones
No aplicar cuando los cultivos estén bajo situaciones de stress tales como sequía prolongada, baja fertilidad, bajas temperaturas o heladas pues el control puede ser deficiente y el cultivo resultará afectado.
Advertencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a fungicidas, lo cual podría verse reflejado en falta de efectividad del producto. Para evitar la generación de resistencia se recomienda rotar con fungicidas de distinto modo de acción.

Preparación
Verificar el buen funcionamiento del equipo y su correcta calibración antes de iniciar una aplicación. Agréguese la dosis del coadyuvante primero y luego la del producto en el tanque de la máquina ya cargado con agua hasta la mitad de su volumen y luego, con los agitadores en funcionamiento, completar el resto del volumen de agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
El producto debe ser aplicado luego de que se seque el rocío. En condiciones climáticas favorables. No aplicar en horas de máxima insolación. No aplicar con vientos superiores a 10 km/hora. Para obtener un resultado eficaz se deben lograr entre 20 y 30 gotas/cm2.

Aplicaciones terrestres
Maquinas pulverizadoras convencionales de arrastre o autopropulsadas, con barras provistas de cono hueco o XR Teejet. La presión de los picos debe ser superior a 40 lb/pg2 y el caudal de aplicación debe ser de no menos de 120 litros/ha.
Para un buen control es indispensable lograr una buena penetración del producto y una cobertura total y uniforme del lote.

Aplicaciones aéreas
El volumen mínimo de aplicación debe ser de no menos de 15 l/ha. No deben realizarse aplicaciones con gas oil.

Compatibilidad
El producto puede aplicarse en mezcla de tanque con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de utilizarse en mezcla se recomienda realizar una prueba a pequeña escala para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Derrames:
En caso de derrames cubra el producto con un material adsorbente (ej.: tierra, arena, aserrín, aglutinante de productos químicos, etc.) y luego barra y recoja con una pala y coloque los desechos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en plantas habilitadas para tal fin.
Limpiar el área afectada evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 3 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar ropa protectora adecuada procurando que la misma esté siempre limpia, evitando emplear la que se hubiera contaminado por uso anterior. Durante la preparación y aplicación utilizar guantes, careta, sombrero, y botas de goma.
Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

Información Toxicológica:

Del producto:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL 50: > 3129 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL 50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (ratas):	LC 50: > 1,52 mg/m3

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Moderadamente tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico

Producto muy tóxico para peces, por lo que se recomienda dejar una franja de seguridad de 50 metros entre el área a tratar y el agua libre en superficie cercana. No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua. No contaminar fuentes de agua arrojando remanentes de caldos de pulverizaciones, limpiezas de equipos ni envases de plaguicidas en acequias o ríos.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE para este producto.
Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.