Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

BRADYRHIZOBIUM SPP. + LIPO-QUITO OLIGOSACARIDOS (LCO) + CARBENDAZIM + TIRAM

Marcas comerciales: NITRAGIN OPTIMIZE II PACK FULL **.

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium
Carbendazim: 2-metoxicarbamoil-bencimidazol.
Tiram: bisulfuro de tetrametiltiocarbamilo.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.) + benzimidazol + dimetilditiocarbamato.
Acción: de contacto, sistémica, fijación biológica del nitrógeno (fbn) y promotor del crecimiento vegetal (pgpr).

Uso: curasemillas e inoculante (fungicida).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Soja	Nitragin Optimize II Pack Full 100 ml (Nitragin Protreat) + 70 ml (Nitragin BioPower (*), + 150 ml (Nitragin Optimize II) por cada 50 kg de semilla.	Inmediatamente o hasta 7 días antes de la siembra.

(*) Nitragin BioPower: Emulsión de aceite en agua para proteger y prolongar la supervivencia bacteriana luego del tratamiento de la semilla.

Información General:

Los LCO (LIPO-QUITO OLIGOSACÁRIDOS según sus siglas en inglés) son moléculas naturales y potentes señales producidas por el género Rhizobium, esenciales para el proceso de nodulación de la soja. La tecnología Nitragin Optimize II contiene la bacteria Bradyrhizobium japonicum y por proceso de biosíntesis se incluye a la molécula de LCO específica para soja. En términos generales la tecnología LCO facilita el proceso de reconocimiento entre las bacterias (Rhizobium) y la soja además de promover a otros procesos de crecimiento durante el desarrollo temprano de las plantas (ej. formación de raíces). Así se logra una temprana nodulación, mejoras en el uso de agua y nutrientes, plantas con mayor vigor y, una fijación biológica del nitrógeno más eficiente.
Esta es una nueva generación en tratamientos biológicos de semillas con moléculas mejoradoras del crecimiento, con proceso de obtención y fabricación en donde cada envase de Nitragin Optimize II, contenga la molécula correcta de LCO en la dosis exacta.
Generalidades del Pack
Nitragin Optimize II Pack Full, ofrece un tratamiento integral para semilla de soja que facilita la Fijación Biológica de Nitrógeno, promueve el Crecimiento Biológico Vegetal, brinda la máxima protección a la semilla, mejorando de esta manera la performance del cultivo.
Dosis de uso

Producto	Aptitud	Dosis (en cm3 para 50 kg de semillas)
Nitragin Optimize II	Inoculante	150 cm3
Nitragin BioPower	Aditivo protector	70 cm3
Nitragin Protreat	Fungicida	100 cm3
Total		320 cm3

Preparación de los productos
1. Agite bien los productos antes de abrir.-
2. Coloque el fungicida Nitragin Protreat®.-
3. Coloque el aditivo protector Nitragin BioPower®.-
4. Agregue por último el inoculante Nitragin Optimize II-
5. Mezclar hasta homogeneizar.-
6. Trate las semillas dentro de las 4 horas de realizada la mezcla.

Recomendamos leer el manual de aplicación que se encuentra en el interior de la caja y seguir las instrucciones para el sistema de aplicación que será utilizado.
Recomendaciones de Uso (Nitragin Optimize II)
Agitar bien antes de usar, mezclar uniformemente con la semilla a la sombra y en lugar fresco y sembrar inmediatamente.

- Almacenar en lugares frescos (t< 30°C).-
- Agite bien los productos antes de utilizar.-
- No conserve más de 24hs los envases abiertos.-
- No dejar expuestos al rayo del sol.-
- Inocule hasta 7 días antes de la siembra, conservando la semilla tratada en lugar fresco y a la sombra.

Destruir los envases en desuso y lavar los utensilios empleados en la preparación. No comer, beber o fumar durante las tareas. No debe venderse a personas inexpertas, ni ser utilizado en ambientes domésticos.

Tratamiento de remanentes:
El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El remanente del envase debe permanecer en el mismo, bien cerrado hasta su próxima utilización.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos
Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

este procedimiento 3 veces. Finalmente, destruir el envase perforándolo e intentado no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben incinerarse en instalaciones apropiadas.

Almacenamiento:
Almacenar en un sitio cubierto, seco y en estibas pequeñas, separadas del piso, en su envase original cerrado. Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase original cerrado y claramente identificado. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. Retirar los envases dañados y emplear tierra ó arena para contener y absorber el derrame. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y descartar de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica + 1 (FRAC) + M3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, gafas, máscara facial, botas de goma, protección respiratoria adecuada y ropa de mangas y piernas largas y delantal durante la aplicación.
Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. No emplear sin previo lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores. Finalizados los tratamientos, lavarse prolijamente con agua y jabón, todas las partes del cuerpo expuestas al producto.

Información Toxicológica:

Para el producto formulado Ritiram Carb (10% tiram + 10% carbendazim)
DL 50 oral aguda: > 3000 mg/kg.
DL 50 dermal aguda: > 2000 mg/kg
Advertencia para el médico:
Ante cualquier accidente consultar con "Centro de Atención de Emergencias Toxicológicas".
Producto POCO PELIGROSO (Clase III). En caso de intoxicación por ingestión realizar lavado gástrico. Luego el tratamiento debe ser sintomático y de apoyo. El paciente debe permanecer bajo supervisión médica durante 72 horas. No es un producto sensibilizante cutáneo, es mínimamente irritante de la piel y ligeramente irritante ocular.

Riesgos ambientales

Efectos agudos para peces: 8.67 mg/kg
Toxicidad para aves: > 2000 mg/kg.
Toxicidad para abejas: no tóxico.

Producto ligeramente tóxico para abejas, muy tóxico para peces y ligeramente tóxico para aves. No dejar semillas tratadas sin sembrar al aire libre que puedan ser ingeridas por aves. No desechar semillas tratadas en fuentes de agua.
Respetando sus características de uso no presenta riesgos ambientales.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
NITRAGIN OPTIMIZE II PACK FULL **	MONSANTO ARGENTINA SAIC	Pack n° 111	AL + SC + AL	(5X10 exp9 ufc/ml) + (15%+35%)

** Nitragin Optimize II + Nitragin Protreat + Nitragin BioPower