Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

COMPUESTO 27 - 0 - 0

Marcas comerciales: ASP NITRO LL.

Nomenclatura Química:
Compuesto N
Clasificación Química: compuesto inorgánico.
Acción: aporte de nitrógeno.

Uso: fertilizante (Recomendaciones de Uso para Aplicaciones ferti-riego).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Árboles fructíferas (citrus, café, otros)	20 a 100 l/ha	Aplicar al suelo en jacto dirigido/ferti-riego a el área de copa de la planta, repetir según la necesidad de N.
Banano o plátano		Aplicación en suelos/ferti-riego, en etapas de desarrollo y alto consumo de N, repetir con 60 días si es necesario.
Caña de azúcar	30 a 100 l/ha	Aplicar en el suelo/ferti-riego, dirigido al surco de siembra según la necesidad de N.
Flores (macetas / vasos) Ornamentales (macetas / vasos)	10 a 20 cm3 /cm3 de suelo	Aplicar directo en el suelo/ferti-riego o tierra de la maceta.
Flores (para corte de tallos) Ornamentales (para corte de tallos)	5 a 10 l / m2 de cantero	Aplicación en suelo/ferti-riego, en la línea del (cantero), antes de la siembra/trasplante)
Hortalizas (hojas verdes, solanáceas, cucurbitáceas y otras)	10 a 15 l / 1000 m2	Aplicación en suelo/ferti-riego, en la línea del cultivo (cantero), antes de la siembra/trasplante.

Información General:

Composición: (% en peso de elemento)
Nitrógeno total, expresado como N 27%
Reacción en el suelo Àcida
Índice 42
pH: 10,1
Densidad: 1,23 g/cm3
Solubilidad: Soluble

Grado: 27-0-0

Forma de aplicación:
Aplicar el producto con un volumen de agua de 200-400 l/ha según desarrollo del cultivo.
Las preparaciones foliares pueden ser realizadas con equipos pulverizadores comunes de agroquímicos. El producto se disuelve muy bien en agua.
Usar conjuntamente con tensioactivo no iónico - no polar, a una concentración del 0,5 - 1% o conjuntamente con fitosanitarios.

Restricciones de uso:
No aplicar en horas de gran insolación o gran temperatura.

Compatibilidad:
Es compatible con otros fertilizantes y agroquímicos, comprobando previamente en una pequeña mezcla, si la misma sigue emulsionada.

La fertilización foliar es un complemento y no un sustituto de la fertilización de base.

Precauciones:
Durante la preparación y aplicación usar ropa protectora adecuada. No beber, comer ni fumar, durante el tratamiento. Mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas.

Uso: fertilizante (Dosis Recomendada en Aplicaciones Foliares).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón Arroz Centeno Girasol Maíz Soja Trigo	3 a 30 l/ha	Aplicación foliar en estadio V3/V4 en el macollaje y/u hoja bandera (trigo, arroz), repetir si es necesario.

Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE
ISBN: 978-987-1563-08-1

y otros		
Árboles fructíferas (citrus, café, otros)	5 a 30 l/ha	Aplicación foliar, en la salida de brotes / vegetación, repetir si es necesario.
Banano o plátano	3 a 20 l/ha	Aplicación foliar, en etapas de alto consumo de N en fumigación terrestre o aérea.
Caña de azúcar	5 a 30 l/ha	Aplicación foliar, a partir de los 15 días de salida de los brotes.
Florales	200 a 500 cm3 / 100 l de agua	Aplicación foliar en etapa de alto desarrollo y consumo de N, repetir 30 - 40 días después si es necesario.
Florales (macetas / vasos) Ornamentales (macetas / vasos)	200 a 500 cm3/100 l de agua	Aplicación foliar en etapa de alto desarrollo y consumo de N, repetir 30 - 40 días después si es necesario.
Hortícolas (hojas verdes, solanáceas, cucurbitáceas y otras)	3 a 15 l/ha	Aplicación foliar 7 - 15 días después de emergencia, repetir según necesidad.

Uso: fertilizante (Dosis Recomendada en Aplicaciones Directas al Suelo).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón Arroz Centeno Girasol Clearfield Maíz Soja Trigo y otros	20 a 200 l/ha	Aplicación de alto contenido de N en el suelo, a la siembra, en la línea de siembra, o en la entrelinea en post siembra.

Derrames:

Pequeños derrames: diluir o levantar y destinar a mezclas de compostaje.

Grandes derrames: levantar suelo contaminado y destinar a lugares autorizados, especialmente a land farming como nutrientes para bacterias degradadoras. Controlar napas subterráneas y cursos superficiales, no verter en ellos.

Información toxicológica de los componentes: sus componentes no son tóxicos. No son productos comestibles. Aguas contaminadas pueden causar, sobre todo en niños metahemoglobinemia que produce anoxia anémica por imposibilidad de transportar el O2 a los tejidos.

Clasificación (modo o sitio de acción): no aplica.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:

Protección personal: antiparras de seguridad, guantes PVC, ropa de mangas largas, delantal impermeable o ropa impermeable en el manipuleo de válvulas, de ser necesaria protección respiratoria para ingreso a tanques vacíos: filtros para amoníaco. Corresponde en este caso aplicar permiso de trabajo para espacios confinados.

Protección personal en emergencias: botas impermeables, ropa impermeable, antiparras de seguridad, protección respiratoria.

Información Toxicológica:

Ante cualquier intoxicación consultar con Centros de Atención de Emergencias Toxicológicas.

Riesgo ambiental

No acumulativo en prácticas normales de aplicación para la agricultura. Toxicidad acuática: se dispersa y diluye fácilmente. Concentrado generará excesivo desarrollo de algas, y eutrofización. Los productos de degradación pueden producir toxicidad en peces, evitar descargas hacia cursos de agua. No es un contaminante marino.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
ASP NITRO LL	AGROSERVICIOS PAMPEANOS	16261	LIQUIDO	27 - 0 - 0