PROTHIOCONAZOLE + FLUOXASTROBIN + TEBUCONAZOLE

Marcas comerciales: SCENIC.

Nomenclatura Química:
prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil)-1,2-dihidro.
fluoxastrobin: metanona, [2-[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]oxi]fenil](5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) -,O-metiloxima.
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1-1dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1etanol.
Clasificación Química: triazol + estrobilurina + triazol.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: curasemillas (fungicida e insecticida).

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Cebada	Carbón cubierto (*Ustilago hordei)* Carbón desnudo de la cebada (*Ustilago nuda hordei)* Mancha en red (*Drechslera teres)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*	125-150 cm3/100 kg de semilla	Tratamiento de semillas pre-siembra.
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia caries)* Carbón volador (*Ustilago nuda f. sp. tritici)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*		

Información General:

Generalidades:
Prothioconazole+fluoxastrobin+tebuconazole es un fungicida para tratamiento de semillas. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa controlando aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones). Prothioconazole es un fungicida de la clase química de las triazolintionas y actúa interfiriendo la ruta metabólica del ergosterol. Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, impidiendo la multiplicación del hongo. Fluoxastrobin es un fungicida de la familia de las estrobilurinas. Su acción preventiva está dada por la inhibición del proceso germinativo de la espora, siendo su acción curativa y erradicativa basada en la inhibición del crecimiento del micelio una vez establecida la enfermedad.

Técnicas y equipos de aplicación

Prothioconazole+fluoxastrobin+tebuconazole es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. El volumen de aplicación deberá ser de 1 a 1,5 litros de caldo por cada 100 kg de semilla de trigo. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, limpia de tierra y cuerpos extraños y dentro de los rangos de calidad en cuanto a germinación.
Compatibilidad:
Se recomienda utilizar prothioconazole+fluoxastrobin+tebuconazole solo. Si se desea utilizar en conjunto con otro producto formulado, realizar una pequeña prueba de compatibilidad antes de la aplicación.
Fitotoxicidad:
Prothioconazole+fluoxastrobin+tebuconazole no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Durante la preparación y la aplicación use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los operarios de siembra. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: > 2.500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (conejo): DL 50: > 4.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50: > 2,995 mg/l

Irritación dermal:	Ligeramente irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante
Sensibilización cutánea:	Sensibilizante

Riegos ambientales
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Toxicidad para peces: Muy tóxico.
Debido a su forma de aplicación no presenta riesgos. Se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. No contaminar alimentos y forrajes. Evitar la deriva durante las aplicaciones.
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico. Debido a su forma de aplicación no presenta riesgos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
SCENIC	BAYER	35772	FS	3.75 + 3.75 + 0.5	III