GLIFOSATO + 2,4D + DICAMBA

Nomenclatura Química:
Glifosato: sal monoisopropilamina de N-(fosfonometil) glicina
2,4D: sal monoisopropilamina de 2,4 diclorofenoxiacético
Dicamba: sal monoisopropilamina de dicamba: ácido 2-metoxi-3,6- diclorobenzoico
Clasificación Química: fosfonometilglicina+ ácido aril oxi lacanoico + ácido benzoico
Clasificación Química: fosfonometilglicina + ácido aril oxi alcanoico + ácido benzoico.
Acción: sistémica y foliar.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Áreas agrícolas no cultivadas Barbecho químico	Bejuco (*Ipomoea sp.)* Cebollín (*Cyperus rotundus)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdiz (*Cynodon dactylon)* Heliotropo (*Heliotropium spp.)* Parietaria, Ocucha (*Parietaria debilis)* Pie de gallina (*Eleusine indica)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Soja guacha (*Glicyne max)* Sorgo de Alepo (*) (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*	3 a 5 l/ha		Cuando las malezas están en crecimiento activo y no sufren estrés. Si las malezas son cortadas antes de la aplicación, esperar el rebrote para aplicar.

(*) Dosis recomendada para Sorgo de Alepo no resistente al glifosato. Ante la probable aparición de biotipos resistentes, se recomienda consultar a su asesor técnico sobre las combinaciones de productos a utilizar y métodos de manejo más recomendables.

Información General:

Las dosis menores se utilizarán cuando en la composición florística predominen gramíneas o cuando las malezas se encuentren en sus primeros estadios de desarrollo y en activo crecimiento. Las dosis mayores se utilizarán cuando la proporción de malezas latifoliadas sea alta, con malezas en un estado de desarrollo mayor y en malezas que hayan sufrido estrés ambiental leve.

Preparación:
Es una mezcla que se presenta como un concentrado soluble, debiendo mezclarse con agua limpia para su aplicación como pulverizado. Agregar el producto al tanque de aplicación lleno con agua y con los agitadores en funcionamiento, manteniéndolos en marcha durante la aplicación.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres: debe utilizarse la dosis recomendada diluida en agua limpia, a razón de 80 - 120 l/ha. Las pastillas recomendadas son las de abanico plano (Nº 8003, 8002, 11002, 11003) trabajando a una presión entre 25 y 40 lb/pulg2.
Se debe lograr una cobertura de 20 - 30 gotas/cm2. Para preparar la solución de aspersión debe llenarse el depósito con agua hasta la mitad, agregarle la dosis recomendada de producto y completar el llenado. Debido a la alta solubilidad del herbicida, es suficiente la agitación provista por el retorno de la pulverizadora.
Aplicaciones aéreas: aplicar volúmenes totales entre 15 y 30 l/ha (herbicida + agua); observando las precauciones habituales en cuanto a horario y altura de vuelo, tamaño de las gotas y orientación de los picos y condiciones meteorológicas.

Las aplicaciones aéreas o terrestres no deben efectuarse cuando exista riesgo de deriva sobre plantas o cultivos susceptibles, o sobre tierras preparadas y listas para ser sembradas por éstos cultivos.
No aplicar si las malezas han sufrido estrés térmico o hídrico ya que esto determinará una menor eficacia del herbicida.
Tampoco aplicar si las malezas están cubiertas con tierra o si se prevé una lluvia durante las seis horas posteriores a la aplicación. Luego de la aplicación, esperar al menos 15 días para la siembra del cultivo. El producto no debe aplicarse si la velocidad del viento supera los 12 km/h.
Restricciones de uso:
Exento de período de carencia.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a las normativas provinciales y municipales correspondientes.

Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas.

Compatibilidad: no es recomendable mezclar con herbicidas a base de sal potásica o monoamónica de glifosato, ni agregar sulfato de amonio al caldo porque puede provocar la precipitación del mismo. Siempre es recomendable realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla en el tanque, ya que las dosis utilizadas, el número de productos, el uso de coadyuvantes y la calidad del agua influyen en la probabilidad de formación de precipitados.

Fitotoxicidad: Se recomienda dejar transcurrir 15 días desde el momento de la aplicación hasta la siembra del cultivo posterior, a fin de evitar posibles efectos de fitotoxicidad por residualidad del 2,4-D en el suelo.
Con condiciones ambientales y edáficas desfavorables para la actividad microbiana en el perfil (como bajas temperaturas, sequía, bajo contenido de materia orgánica y/o gran cantidad de rastrojo en superficie) este período debería ser aún mayor.

Derrames:
Sólido: recoger con pala el producto derramado y la capa superficial de suelo afectado. Caldo de pulverización: contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra). Barrer el producto absorbido y recoger. Depositar los derrames en bolsas o recipientes biien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas.
No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): G (HRAC) + O (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su respiración al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal de goma, botas de goma de alta resistencia, guantes de nitrilo, protector facial o anteojos, y protección respiratoria adecuada.

Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber ni fumar durante su manipuleo.

Información Toxicológica:

Producto formulado:
DL 50 oral aguda: 550 mg/kg (rata).
DL 50 dérmica aguda: > 2000 mg/kg (rata).

Los síntomas de intoxicación incluyen pérdida de apetito, náuseas, vómitos, vértigo, dolor de cabeza, astenia, insomnio y somnolencia.

Riesgos ambientales:
Ligeramente tóxico para aves.
Prácticamente no tóxico para peces.
Virtualmente no tóxico para abejas.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.