BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS

Marcas comerciales: SERIFEL.

Nomenclatura Química:
Bacillus amyloliquefaciens raza MBI600
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: acelerador biológico de secado de forrajes y fungicida.

Uso: fungicida

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de Aplicación
Frambuesa Frutilla	Botrytis (Botrytis cinerea)	0.5 kg/ha	Aplicar preventivamente en condiciones favorables para la enfermedad a partir de la fase vegetativa hasta la pre-cosecha. Se deberá realizar un mínimo de 4 aplicaciones cada 7 días, durante el ciclo del cultivo.

Información General:

Es un fungicida biológico con acción preventiva, recomendado como herramienta para el manejo integrado de enfermedades en plantas cultivadas.
Especialmente recomendado para el control de Botrytis en el cultivo de frutilla y frambuesa.
Los lipopeptídeos producidos por el microorganismo Bacillus amyloliquefaciens cepa MBI 600 presentes en la formulación de Serifel®, actúan en la membrana celular de las estructuras reproductivas del hongo fitopatógeno, produciendo rupturas y provocando su deformación. El Bacillus amyloliquefaciens, cepa MBI 600 también actúa por competencia de espacio y nutrientes en la superficie del vegetal así como también produce una endospora que le permite soportar condiciones ambientales extremas como el calor y la desecación, proporcionando así una ventana de aplicación más flexible.
Debe ser utilizado en pulverizaciones preventivas y en rotación con otros fungicidas con distintos modos de acción para el control y manejo integrado de enfermedades de parte aérea.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación: Debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego, con el agitador en funcionamiento, verter la cantidad recomendada de Serifel® al tanque del pulverizador. Completar el tanque con agua. Mantener el caldo en agitación durante toda la aplicación.
Si Serifel® ha sido mezclado con el agua de aplicación no almacene este caldo por más de 24 horas.
Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: En el cultivo de frutilla y frambuesa, se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo (500 l/ha).
NO DEBE UTILIZARSE SERIFEL®, FUNGICIDA, EN FORMA DISTINTA A LA INDICADA EN EL MARBETE.

RESTRICCIONES DE USO
Serifel puede ser aplicado hasta e incluso el día de la cosecha. No posee LMR (Límite Máximo de Residuos) ni PC (período de carencia).
Compatibilidad: Serifel® es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de frutilla y frambuesa. Para mezclas específicas consultar con el departamento técnico BASF.
Reingreso al área tratada: Se puede ingresar al área tratada en cuanto se seque la solución aplicada. En caso de mezclas, guardar la recomendación dada para los otros productos.
Fitotoxicidad: No se ha reportado fitotoxicidad de Serifel® cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones de dosis y aplicación.

Derrames:
Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos domiciliarios.

Clasificación (modo o sitio de acción): Grupo 44.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico. Categoría IV Producto que normalmente no ofrecen peligro.
Riesgos ambientales: no tiene. Producto prácticamente no toxico para aves y peces. Virtualmente no toxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
SERIFEL	BASF ARGENTINA	39983	SÓLIDO	5,5 x 10 exp10 UFC/gramo