BRADYRHIZOBIUM ARACHIS

Marcas comerciales: ADHERE MANI - HICOAT SUPER MANÍ - HISTICK 2 MANI.

Nomenclatura Química:
Bradyrhizobium arachis
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: inoculante.

Uso: inoculante (HISTICK 2 MANI).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Maní	1,4 l / ha para siembra a 70 cm entre surcos o 28,6 cm3/300 m de surco Mezclar 6 litros de inoculante con 3 litros de Hi Coat® Super Extender y aplicar los 9 litros resultantes en 2000 kg de semilla	Aplicación en el surco a la siembra.

Información General:

HISTICK 2 MANI es un inoculante líquido con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno seleccionadas y controladas, que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima producción del cultivo de maní.

Aplicación

- Limpiar el equipo. Asegurar que la máquina para aplicar líquidos esté libre de residuos químicos antes de añadir el inoculante.
- Configurar la pulverizadora para la aplicación en surcos. Seleccionar e instalar un disco regulador apropiado de flujo (orificio) de manera de obtener una corriente constante de líquido dentro del surco. Ajustar la posición y el flujo del liquido c/el inoculante de forma que este caiga directamente sobre la superficie de las semillas antes de cubrir el surco. La eficacia del producto puede estar limitada si el inoculante es aplicado arriba o a un lado de las semillas en el surco.
- Agitar bien antes de usar. No abrir el paquete antes de su uso. Vaciar el contenido del paquete dentro del tanque de la pulverizadora. Ajustar el volumen del tanque pulverizador al nivel requerido usando agua limpia, fresca y libre de cloro.
- Asegurar que el inoculante sea mezclado por completo antes de su uso. Para evitar la sedimentación del producto mantener el tanque pulverizador en agitación constante. El inoculante ya diluido debe usarse antes de las 24 horas. No permitir que la temperatura de la mezcla del tanque supere los 28ºC.
- El volumen de la aplicación debe ser de 50-100 litros por hectárea para pulverizadoras de bajo volumen y de 100 a 200 litros por hectárea para pulverizadoras mayores.
- Para un ancho de surco de 70 cm., asegurar que el equipo esté calibrado para suministrar la dosis correcta de aplicación: 28,6 ml/300 m de surco, o sea 1,4 litros/ha.

Uso: inoculante (en turba (ADHERE MANI).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Maní	400g / 100 kg de semilla	Sembrar dentro de 24 horas de tratada la semilla.

Información General:

ADHERE MANI es un inoculante sólido en turba esterilizada con una alta concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno, que suministran a las plantas el nitrógeno necesario para su desarrollo y óptima producción del cultivo de maní.
ADHERE MANI es un producto de muy alto potencial elaborado con base turba estéril, para ser aplicado directamente en los cajones de la sembradora.
ADHERE MANI puede ser aplicado sobre la semilla en seco sin agregado de aditivos asegurando una alta concentración de Rhizobium. La formulación altamente adhesiva de ADHERE MANI asegura una buena distribución y cobertura de la semilla.

Aplicación
Una bolsita de ADHERE MANI de 400 gramos sirve para tratar 100 kilos de semilla. Aplicar el inoculante en capas en el cajón de la sembradora alternando entre semilla e inoculante mezclando bien para lograr una distribución homogénea. Altas dosis del inoculante no afectan en forma adversa al cultivo. Para un optimo desempeño sembrar dentro de las 24 horas de tratada la semilla.

Compatibilidad
Algunos tratamientos de semilla son dañinos para los inoculantes. En caso de dudas consulte a su distribuidor o a BASF Argentina S.A.

Precauciones
- Mantener fuera del alcance de los niños

- No exponer al sol
- Almacenar en lugar fresco y a la sombra, con temperaturas inferiores a 28º C
- Antes de usar, verificar la fecha de vencimiento.
- No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.
- Los recipientes y utensilios que se utilicen para la preparación del producto, deben estar perfectamente limpios.
- Es aconsejable evitar la siembra en horarios de máxima intensidad solar. De no ser posible, recomendamos colocar bolsas de arpillera mojadas sobre la tapa de la tolva sembradora, para mitigar las altas temperaturas.
- Sembrar en suelos húmedos y en época adecuada, procurando una rápida germinación.
- Evitar el contacto directo de los fertilizantes con las semillas inoculadas.
- No mezclar con fungicidas líquidos o en polvo de uso habitual. Estos deben ser aplicados antes de la inoculación.
- Bajo condiciones adversas y en lotes sin antecedentes de cultivo, se recomienda doble dosis.
- Mantener refrigerado entre 4 y 10 ºC.
- No exponer al sol.
- Antes de usar, verificar la fecha de vencimiento.
- No dejar semilla inoculada expuesta a la luz solar, vientos o altas temperaturas.
- Mantenga el envase cerrado hasta su uso.

Almacenamiento
ADHERE MANI y HISTICK MANI contienen microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en sus envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas inferiores a 25º.
Hicoat Super Maní contiene microorganismos vivos en un medio estéril, por lo que es necesario evitar su exposición al sol y a temperaturas elevadas. Almacenar en envases originales en lugar fresco, seco y con temperaturas entre 4 y 10 ºC.

Derrames:
Debido a las características de un producto biológico, la eliminación se asimila al tratamiento de residuos domiciliarios.

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar guantes de acrilonitrilo, protección ocular, botas de goma, ropa de mangas y piernas largas.

Información Toxicológica:

Producto no tóxico.
Riesgos ambientales: no tiene.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Grado/Conc.
ADHERE MANI	BASF ARGENTINA	20706	TURBA	2 x 10 exp9 bact/cm3
HICOAT SUPER MANÍ	BASF ARGENTINA	21150	LÍQUIDO	2 x 10 exp9 bact/cm3
HISTICK 2 MANI	BASF ARGENTINA	21353	LÍQUIDO	2 x 10 exp9 bact/cm3