BIFENTRIN + NOVALURON

Marcas comerciales: BIFLEX PLUS.

Nomenclatura Química:
bifentrin: (2-metil (1,1´-bifenil)-3-il) metil 3-(2-cloro-3,3,3 trifluoro-1-propenil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato
novaluron: (1-[3-chloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluoromethoxyethoxy)phenyl -3-(2,6-difluorobenzoyl) urea
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: piretroide + benzolfenilureas.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 20%+10%: 75 cm3/ha	30	Antes de floración (*): aplicar cuando se encuentren por lo menos desde 15 orugas de más de 1,5 cm, por metro lineal de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración (*): aplicar cuando se encuentren por lo menos 10 orugas de más de 1,5 cm, por metro lineal de surco y más de 10% de daño al follaje.
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)* Oruga medidora (*Rachiplusia nu)* Oruga medidora (*Pseudoplusia includens)* Oruga militar tardía (*Spodoptera frugiperda)*	PC 5%+5%: 200 cm3/ha + 500 cm3/ha de aceite mineral		Iniciar los tratamientos cuando se hayan encontrado como máximo 10 orugas por metro lineal de cultivo.
	Trips (*Thrips spp.)*			Aplicar con un promedio de 5 ninfas/foliolo.
	Tucuras (*Dichroplus spp.)*			Aplicar con promedio 2 tucuras chicas/metro.

(*) Umbrales de Tratamiento indicados por INTA. Consultar al INTA correspondiente a la zona donde se aplicará el producto.
Es recomendable implementar un cuidadoso monitoreo de la plaga y o seguir los métodos de monitoreo recomendados en cada región para decidir el momento correcto de la aplicación y obtener la mejor eficacia del producto. Si fuese necesario realizar una nueva aplicación del producto, observar el nivel de infestación procediendo de acuerdo a las instrucciones de uso siguiendo siempre las buenas prácticas agrícolas.

Información General:

La mezcla de los principios activos bifentrin y novaluron, combinan insecticidas de acciones complementarias. El bifentrin pertenece al grupo de los piretroides, es un insecticida no sistémico con acción directa por contacto y acción estomacal. Actúa sobre el sistema nervioso con rápido poder de volteo y prolongada acción residual. Actúa sobre lepidópteros, hemípteros, homópteros y otros órdenes de importancia agrícola
El novalurón pertenece al grupo de las benzoilfenil ureas, que se caracterizan por inhibir la formación de quitina y producir la muerte de los insectos al momento de la muda. Desde que el insecto toma contacto con el producto disminuye el daño, pudiendo transcurrir 2 o 3 días hasta que se produzca la muerte. Es un larvicida que actúa por ingestión. Tiene efectos de menor consideración por contacto; como ovicida y supresor de la fecundidad en hembras adultas.
Estos productos son adecuados para ser incorporados a los sistemas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Es fundamental observar las instrucciones de uso con lo que se obtendrán los mejores resultados.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
Agitar bien antes de usar. Verificar el correcto funcionamiento del equipo y su calibración, antes de comenzar la aplicación.
Preparación: llenar el tanque de la pulverizadora hasta las 2/3 de su capacidad con agua y, poniendo en marcha los agitadores, incorporar la cantidad de producto según dosis. Completar el volumen total de agua. Mantener el sistema de agitación en movimiento durante toda la aplicación. Evitar la superposición de franjas y la deriva hacia cultivos linderos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para la aplicación de estos productos, emplear máquinas pulverizadoras terrestres o aéreas. En aplicaciones aéreas, el caudal debe ser de al menos 8 l/ha. Utilizar pastillas cono hueco.

Compatibilidad:
Estos productos son compatibles con un gran número de insecticidas de uso común. No mezclar con materiales alcalinos pues reducen su eficacia. Para la mezcla con otros plaguicidas deben realizarse pruebas previas que demuestren la compatibilidad entre los productos y de la mezcla con el cultivo.

Restricciones de uso: entre la última aplicación y la cosecha, deben transcurrir 30 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas después de la aplicación. Utilizar ropas protectoras adecuadas.
Fitotoxicidad: no se registra fitotoxicidad en el cultivo, utilizando bifentrin + novaluron en las dosis y momentos de aplicación recomendados.

Derrames:
Aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y adsorber el derrame con material absorbente (arena, tierra, arcilla) Lavar el área con detergente industrial fuerte y absorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el adsorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente. Evitar que el derrame alcance corrientes de agua, alcantarillas o desagües.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3A (IRAC) + 15 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Medidas de precaución personal: evitar el contacto con los ojos, piel o las ropas, o su inhalación al manipular el producto. Usar traje protector, camisa de mangas largas, pantalones largos, delantal, botas de goma, guantes de nitrilo, protector facial, máscara y anteojos. Después de manipular y aplicar el producto, lavar con abundante agua y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto y las ropas utilizadas en su aplicación en forma separada del resto de la ropa de uso diario. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 20%+10%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL 50: 500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL 50: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL 50: 3,235 mg/l

Irritación dermal: No irritante
Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización cutánea: No sensibilizante.

Del producto formulado 5%+5%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 310 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: >1,54 mg/l (NOCIVO)

Irritación ocular: Leve irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante

Primeros auxilios:
En caso de inhalación, se recomienda el trasladar a la víctima a un lugar con aire fresco. Procurar inmediata atención médica. Si fuera por ingestión, no inducir el vómito. Nunca administrar nada oralmente a una persona inconsciente. Lavar la boca con agua. Procurar inmediata atención médica.
Irritante para ojos y piel.
En contacto con la piel, quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón. Procurar inmediata atención médica.
En contacto con los ojos, lavar los ojos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Consultar inmediatamente con un especialista.
Antídoto: no existe un antídoto específico. Tratar sintomáticamente y dar terapia de soporte.

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Altamente tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico

Riesgos ambientales
Altamente tóxico en abejas. No aplicar con abejas presentes. No realizar aplicaciones en el horario del pecoreo de las abejas. Trasladar las colmenas por lo menos a 4 km. a partir del límite tratado y por un tiempo mínimo de 30 días. En caso de no poder trasladar las colmenas, tapar las piqueras con arpillera o espuma de goma húmeda durante la aplicación. Hacer aplicaciones nocturnas o por la mañana temprano.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BIFLEX PLUS	FMC	37331	SC	20% + 10%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.