FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE

Marcas comerciales: ORQUESTA ULTRA.

Nomenclatura Química:
fluxapyroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2- il)pirazol-4-carboxamida
pyraclostrobin: Metil N-{2-[1-(4-clorofenil) pirazol-3-iloximetil] fenil}(N-metoxi) carbamato
epoxiconazole: (2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole
Clasificación Química: carboxamida + estrobilurina + triazol.
Acción: sistémica.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Roya de la hoja (*Puccinia triticina)* Roya negra o del tallo *(Puccinia graminis)*	1,0 - 1,2 l/ha (*)	38	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas en hoja bandera menos 1 o preventivamente en ZADOCKS 39 (hoja bandera totalmente desplegada).
Soja	Mancha anillada (*Corynespora cassiicola)* Mancha marrón de la soja, Septoriosis (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	0,8 l/ha (**)	30	Para Roya asiática y Mancha en ojo de rana realizar la aplicación al inicio de floración (R1) de observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Caso contrario para éstas o el resto de las enfermedades aplicar preventivamente desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades y los mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en estadios reproductivos tempranos.
Cebada	Mancha en red (*Drechslera teres)* Roya de la hoja de la cebada (*Puccinia hordei)* Ramularia *(Ramularia collo cygni)*	1,0 - 1,2 l/ha (*)	60	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas en hoja bandera menos 1 o preventivamente en ZADOCKS 37 (hoja bandera apenas visible aún enrollada)
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*	1,2 l/ha	45	Iniciar las aplicaciones a la aparición de las primeras manchas/ síntomas. Realizar hasta 2 (dos) aplicaciones de Orquesta Ultra en el ciclo del cultivo, con un intervalo de 21 a 28 días entre aplicaciones. Bajo condiciones predisponentes/alta presión de la enfermedad se deberían acortar los intervalos entre aplicaciones a 21 días. Se recomienda utilizar dentro de un programa de aplicación de fungicidas.
Maiz	Roya del maíz *(Puccinia sorghi)* Tizon (*Exserohilum turcicum = helminthosporium turcicum)*	1,2 l/ha	50	Aplicar a la aparición de los primeros síntomas (Monitorear desde 6 - 7 hojas hasta el inicio de la floración).
Girasol	Mancha o escudo negro del tallo (*Phoma macdonaldii*) Manchas en hojas, tallos y capítulos (*Alternaria helianthi*)	0,8 l/ha	45	Aplicar desde R1, estado de "Estrella" (La inflorescencia rodeada de brácteas inmaduras es visible. Cuando se observa desde arriba las brácteas inmaduras parecen una estrella con varias puntas) hasta R3 (El brote inmaduro alarga a una distancia más de 2 cm sobre la hoja más cercana).

(*) En materiales susceptibles se recomienda utilizar la dosis máxima de Orquesta Ultra. En aplicaciones con alta presión de enfermedades recomendamos el agregado del coadyuvante DASH HC a razón de 300 cm3/ha.
(**) En el caso de aplicaciones curativas o con alta presión de las enfermedades recomendamos el agregado del coadyuvante DASH HC a razón de 300 cm3/ha.

Información General:

FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE es un fungicida sistémico para el control de enfermedades foliares en el cultivo de trigo, cebada y maní (Viruelas) y para el control de las enfermedades de fin de ciclo (Mancha marrón, Tizón de la hoja, Mancha en ojo de rana, Mancha anillada) y Roya asiática en el cultivo de soja. Se recomienda también en el cultivo de Girasol para el control de Manchas en hojas, tallos, capítulos y en el cultivo de Maíz para el control de Roya y Tizón.
FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN + EPOXICONAZOLE es un fungicida de efecto preventivo, curativo y erradicante.
Fluxapiroxad es una carboxamida de última generación con un elevado nivel de actividad, especial diseño molecular y propiedades únicas de distribución en la planta que le permiten ingresar y distribuirse en el interior fácilmente brindado una acción preventiva y/o curativa y duradera. Pyraclostrobin: es una estrobilurina que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos y Oomicetos.

Efectos fisiológicos: el principio activo pyraclostrobin ejerce una acción fisiológica positiva en la planta, interviniendo en el proceso de formación de los granos, mejorando su calidad y rendimiento. Epoxiconazole es un triazol de la familia de los inhibidores del ergosterol (IBE) con acción sistémica y de larga residualidad. La combinación de los tres ingredientes activos permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los fungicidas y contribuye al control fúngico.

Instrucciones de uso

Preparación
Agitar bien el envase de Orquesta Ultra antes de usar. Orquesta Ultra debe aplicarse con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego agregar Orquesta Ultra con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

Orquesta Ultra puede aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo.
Aplicaciones terrestres: se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg2. No utilizar volúmenes inferiores a 150 l/ha ya que los mejores resultados se obtienen con un muy buen mojado.
Aplicaciones aéreas: el volumen no deberá ser inferior a 15 l/ha.

Compatibilidad
Orquesta Ultra es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de trigo, cebada, maní y soja. Para mezclas específicas consultar con nuestro departamento técnico.

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 2 (FRAC) + 11 (FRAC) + 3 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Evitar su inhalación, el contacto del producto con la piel, ojos y mucosas, ropa y la contaminación de los alimentos. Usar protección facial y de cabeza (máscara), guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extralargo durante la preparación y aplicación. Utilizar protección respiratoria para manipuleo de productos concentrados . No comer, beber o fumar, durante dichas tareas, ni destapar con la boca los picos de la pulverizadora. Finalizadas las tareas lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo y la indumentaria expuestas al contacto con el producto.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >500<2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	CL50: 2,38 mg/l
Irritación dermal:	Moderado irritante
Irritación ocular:	Severo irritante
Sensibilización cutánea:	No sensibilizante.

Primeros auxilios

Ingestión: no provocar el vómito. Si la persona afectada está consciente, beber 2-3 vasos de agua. Obtener asistencia médica.

Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón las zonas de la piel afectadas. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.

Contacto ocular: lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Consultar un oftalmólogo.

Inhalación: retirar al aire fresco. Si es necesario, obtener asistencia médica.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Ligeramente tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

No aplicar Orquesta Ultra en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas con Orquesta Ultra hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ORQUESTA ULTRA	BASF ARGENTINA	37414	EC	5% + 8,1% + 5%	II