PENOXSULAM + CYHALOFOP BUTIL

Marcas comerciales: REBELEX.

Nomenclatura Química:
penoxsulam: 2-(2,2-difluoroetoxi)-N-(5,8-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-c] pirimidina-2-il)-6-(trifluorometil) bencenosulfonamida.
cyhalofop butil: butil - (R) - 2 - [4 - (4 - ciano - fluorofenoxi) fenoxi] propionato.
Clasificación Química: triazolopirimidina sulfonamida + ariloxi-fenoxipropionato.
Acción: sistémica.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	Momento de Aplicación
Arroz	Aeschynomene (*Aeschynomene spp.)* Alternantera (*Althernantera philoxeroides)* Brachiaria (*Brachiaria spp.)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Capín (*Echinochloa colonum)* Cebollín (*Cyperus esculentus)* Junquillo (**) (*Cyperus iria)* Ludwigia (*Ludwigia spp.)* Paspalum (*Paspalum plicatulum)*	1,4 -1,6 l/ha	Aplicar antes de floración (*) Aplicar con malezas de hasta 3-4 hojas
	Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Polygonum (*Polygonum spp)* Portulaca (*Portulaca oleracea)*		Aplicar hasta 3 hojas o menos de 10 cm.

(*) En variedades japónicas aplicar a partir del estadío de macollaje del cultivo.
(**) RebelEx controla Cyperus iria siempre que no sea resistente a ALS. En caso de resistencia, este producto no se recomienda para su control.

Información General:

Herbicida sistémico y selectivo, de aplicación post-emergente, que controla malezas gramíneas, latifoliadas y ciperáceas en cultivos de arroz. Se caracteriza por poseer actividad residual en el control de las malezas indicadas en las recomendaciones de uso.

El producto se absorbe a través de las hojas, tallos y raíces, translocándose por el floema y xilema hasta el tejido meristemático donde ejerce su acción herbicida. Las malezas tratadas detienen su crecimiento casi inmediatamente, evitándose así la competencia con el cultivo. Progresivamente se observará la aparición de cambios de coloración y marchitamiento de las malezas hasta producirse la muerte de las mismas

Equipos y técnicas de aplicación: las aplicaciones pueden realizarse con equipos terrestres o aéreos.
Instrucciones para el uso:
Preparación:
1. Llenar el tanque del equipo de aplicación en su totalidad con agua limpia (utilizar filtros).
2. Poner en funcionamiento el sistema de retorno y agitadores.
3. Agregar el producto al tanque, de acuerdo con la superficie que se tratará.
4. Agregar Aceite Vegetal 76,6% p/v en el caldo a razón de 1 % v/v (1 litro de aceite cada 100 litros de caldo) en aplicaciones terrestres y de 1 a 1,5 litros por hectárea para aplicaciones aéreas.
Es importante que el sistema de retorno y agitadores funcionen en todo momento.
Aplicaciones terrestres:
Pastillas abanico plano. Volumen 60-80 l/ha. Presión 40 lb/pulg2
Aplicaciones aéreas:
Volumen 25-40 l/ha
N° gotas: 20-30 gotas/cm2

IMPORTANTE:

- La inundación del cultivo debe realizarse no más allá de los 2 días posteriores a la aplicación del tratamiento herbicida. En caso de demorar la inundación más allá del tiempo recomendado en esta etiqueta, la eficiencia del producto puede verse afectada. Los mejores resultados se logran cuando la aplicación se realiza sobre suelos húmedos o recién bañados.

- Factores ambientales adversos tales como estrés térmico, hídrico o daño causado por otros agroquímicos, pueden alterar el metabolismo y el crecimiento de la planta, induciendo una reducción de la eficacia de control de malezas y la tolerancia del cultivo.
- Aplicaciones con temperaturas medias diarias por debajo de los 16°C, pueden disminuir la eficacia en el control de malezas.

Restricciones de uso:
Período de carencia: uso posicionado en post-emergencia temprana del cultivo. Evitar la deriva sobre cultivos aledaños. NO aplicar con vientos superiores a 10 km/hora.

Compatibilidad: es compatible en mezclas con clomazone, propanil 48 % EC y quinclorac.

Fitotoxicidad: el producto es selectivo para el cultivo de arroz aplicado a las dosis recomendadas en este marbete.

Importante: comenzar la inundación del cultivo 24 horas después de la aplicación del herbicida. No aplicar en casos de falta de humedad prolongada y cuando las malezas presentan síntomas de marchitez. No aplicar en horas del día de máxima insolación y alta temperatura.

Derrames:
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) o 2 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Guantes de nitrilo reforzado; botas de goma; camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas; delantal y antiparras y/o protector facial.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

En caso de ingestión accidental: llamar de inmediato a un médico.

Riesgos ambientales: Moderadamente tóxico para peces y organismos acuáticos. Se recomienda evitar la deriva sobre cuerpos de agua. No inundar la parcela donde se aplique el herbicida por 24 horas como mínimo, para evitar que el producto pueda ser arrastrado hacia cursos de agua cercanos. Prácticamente no tóxico para aves. Virtualmente no tóxico para abejas. El producto no presenta riesgos para el medio ambiente si se usa siguiendo las recomendaciones de este marbete.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
REBELEX	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37226	SE	3% + 21,4%	IV