FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN

Marcas comerciales: PRIAXOR.

Nomenclatura Química:
fluxapyroxad: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2- il)pirazol-4-carboxamida
pyraclostrobin: metil-N[[[1-(4-clorofenil)pirazol-3-il] oxi}-o- tolil]-N-metoxicarbamato
Clasificación Química: carboxamida + estrobilurina.
Acción: sistémica, preventiva, curativa y erradicante.

Uso: fungicida.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Mandarino	Alternaria (*Alternaria citri; alternaria alternata)*	0,2 l	15	1º aplicación: en el mes de Noviembre (según condiciones predisponentes*), FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. 2º aplicación: en el mes de Diciembre, 30 días de la 1º aplicación, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. 3º aplicación: en el mes de Enero, 30 días de la 2º aplicación, FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. En todas las aplicaciones agregar aceite curafrutal al 0,2%. Dosis expresadas cada 1.000 l de agua.
Soja	Mancha anillada (*Corynespora cassiicola)* Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)* Roya asiática de la soja (*Phakopsora pachyrhizi)*	0,35 l/ha	30	Para Roya asiática y Mancha ojo de rana realizar la aplicación al inicio de floración (R1) de observarse los primeros síntomas de la enfermedad. Caso contrario para estas o el resto de las enfermedades aplicar preventivamente desde R3 (inicio de formación de vainas) hasta R5.4 (50% llenado de granos). Los mayores controles de las enfermedades y los mayores aumentos en los rendimientos se logran aplicando en estadios reproductivos tempranos.
Limonero Mandarino Naranjo Pomelo	Mancha Negra (*Guignardia citricarpa; phyllosticta citricarpa)*	0,2 l/ha	15	1º aplicación: en el mes de Noviembre (según condiciones predisponentes*), FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. 2º aplicación: en el mes de Diciembre, 30 días de la 1º aplicación, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. 3º aplicación: en el mes de Enero, 30 días de la 2º aplicación, FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. En todas las aplicaciones agregar aceite curafrutal al 0,2%. Dosis expresadas cada 1.000 l de agua
Limonero Mandarino Naranjo Pomelo	Melanosis (*Diaporthe citri)*			1º aplicación: Pre floración, FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. 2º aplicación: Plena floración, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. 3º aplicación: Post floración, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. En todas las aplicaciones agregar aceite curafrutal al 0,2%. Dosis expresadas cada 1.000 l de agua.
Limonero Pomelo	Sarna de los cítricos, Sarna del agrio (*Sphaceloma spp.)*			1º aplicación: Pre floración, FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. 2º aplicación: Plena floración, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. 3º aplicación: Post floración, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. En todas las aplicaciones agregar aceite curafrutal al 0,2%. Dosis expresadas cada 1.000 l de agua.
Mandarino Naranjo	Sarna de los cítricos, Sarna del dulce (*Elsinoe spp.)*			1º aplicación: Pre floración, FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN 0,2 l. 2º aplicación: Plena floración, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. 3º aplicación: Post floración, oxicloruro de Cu (85%) 3,0 Kg. ú óxido cuproso (60%) 3,0 Kg. o hidróxido de Cu (76,8%) 2,1 Kg. En todas las aplicaciones agregar aceite curafrutal al 0,2%. Dosis expresadas cada 1.000 l de agua.
Vid de mesa y de vinificar	Oidio de la vid (Uncinula necátor)	0,25 l/ha	1	Desde brotes de 15 cm a precierre de racimo.
Avena	Helmintosporiosis de la avena *(Drechslera avenae)* Roya (*Puccinia coronata)*	250-300 ml pf/ha	30	Iniciar las aplicaciones cuando 10 a 20% del número total de hojas presenten síntomas de ataque Roya y 15 a 20% del número total de hojas presenten síntomas de ataque de manchas foliares. Repetir caso se necesario con intervalos de 15 a 20 días, dependiendo de la evolución de la enfermedad, hasta un máximo de 4 aplicaciones por ciclo del cultivo.

				Utilizar dosis más bajas bajo condiciones de menor presión de la enfermedad, y las dosis mayores bajo condiciones severas (clima favorable, inicio de surgimiento de síntomas)
Melón	Oídio de las cucurbitáceas *(Sphaerotheca fuliginea)*	250-350 ml pf/ha	7	Iniciar las aplicaciones cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad o aplicar preventivamente. Repetir caso sea necesario con intervalos de 7 a 14 días, dependiendo de la evolución de la enfermedad, hasta un máximo de 4 aplicaciones por ciclo del cultivo. Utilizar dosis más bajas bajo condiciones de menor presión de la enfermedad, y las dosis mayores bajo condiciones severas (clima favorable, inicio de surgimiento de síntomas)
Pepino		20-35 ml pf/ 1000 litros de agua		
Sandia		250-300 ml pf/ha		
Zanahoria	Alternaria (*Alternaria dauci)*			
Yerba mate	Mal de la tela (*Rhizoctonia binucleate)*	300 ml pf/ha	60	

Cultivo de soja: en el caso de aplicaciones curativas o con alta presión de las enfermedades, recomendamos el agregado del coadyuvante DASH a razón de 250 cc/ha.

Cultivos de limón, mandarino, pomelo y naranja: se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones de Priaxor en la temporada, rotando con otros fungicidas registrados de distinto modo de acción.
En todas las aplicaciones de mandarino, pomelo, limonero y naranjo agregar aceite curafrutal al 0,2%.

Cultivo de vid: se recomienda no realizar más de 2 aplicaciones en la temporada de Priaxor rotando con otros fungicidas registrados de distinto modo de acción.

Información General:

Fluxapyroxad + pyraclostrobin es un fungicida sistémico para el control de las enfermedades de fin de ciclo (Mancha marrón, Tizón de la hoja, Mancha ojo de rana, Mancha anillada) y Roya asiática en el cultivo de soja, como así también para el control de Mancha Negra (Guignardia citricarpa y Phyllosticta citricarpa), Alternaria (Alternaria citri y Alternaria alternata), Sarna de los cítricos (Sarna del dulce: Elsinoe spp.y Sarna del agrio: Sphaceloma spp.) y Melanosis (Diaporthe citri) en los cultivos de, limón, mandarino, pomelo y naranja. También para el control de oidio (Uncinula necator) en vides de mesa y vinificar.

Es de efecto preventivo, curativo y erradicante. La base del control está en la combinación de sus principios activos de diferente modo de accion: fluxapyroxad + pyraclostrobin en alta concentración. Fluxapyroxad es una carboxamida de última generación con un elevado nivel de actividad, especial diseño molecular y propiedades únicas de distribución en la planta que le permiten ingresar y distribuirse en el interior fácilmente brindado una acción preventiva y/o curativa y duradera. Pyraclostrobin: es una estrobilurina que posee rapidez de acción, eficacia y amplio espectro de control sobre patógenos pertenecientes a las clases de Ascomicetos, Basidiomicetos, Deuteromicetos y Oomicetos.
Efectos fisiológicos: el principio activo pyraclostrobin ejerce una acción fisiológica positiva en la planta, interviniendo en el proceso de formación de los granos, mejorando su calidad y rendimiento. La combinación de ambos ingredientes activos permite disminuir el riesgo de desarrollo de resistencia de los fungicidas y contribuye al control fúngico.

INSTRUCCIONES DE USO
Preparación: Importante: agitar bien el envase antes de usar. Debe ser aplicado con agua. Para preparar la mezcla, llenar el depósito de la pulverizadora con agua hasta la mitad o ¾ partes de su capacidad. Luego agregar fluxapyroxad + pyraclostrobin con el agitador en marcha, que deberá estar en constante movimiento durante toda la aplicación. Completar el depósito con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser aplicado con cualquier equipo de pulverización provisto de agitadores y que asegure una buena distribución del producto sobre el cultivo. Aplicaciones terrestres: se deben utilizar picos "cono hueco" o XR Teejet y alta presión 70 lb/pulg2. No utilizar volúmenes inferiores a 150 l/ha ya que los mejores resultados se obtienen con un muy buen mojado. Aplicaciones aéreas: el volumen no deberá ser inferior a 15 l/ha.
En el cultivo de cítricos: se recomienda aplicación de Priaxor con máquinas pulverizadores de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo. Volúmenes recomendados de agua 2000 a 5000 L/ha.

En el cultivo de vid se recomienda su aplicación con máquinas pulverizadoras de alto o bajo volumen manuales o con motor, efectuando un mojado completo de las plantas pulverizando hasta punto de goteo (750 a 1000 L/ha).

En el cultivo de zanahoria: Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de 400 a 700 litros por hectárea.

En el cultivo de melón, sandia, pepino: Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de 400 a 1000 litros por hectárea.

En el cultivo de avena Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de 150 a 200 litros por hectárea.

En el cultivo de Yerba mate: Se recomienda la aplicación con equipo pulverizador con un volumen de agua de 500 litros por hectárea.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la aplicación y la cosecha deberán transcurrir: soja: 30 días, limón, mandarino, pomelo y naranja: 15 días; vid 1 día.
En caso de que el cultivo tratado o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Tiempo de reingreso al área tratada: Se recomienda aguardar el completo secado del producto sobre las hojas de las plantas tratadas, antes del reingreso al área.

Compatibilidad: FLUXAPYROXAD + PYRACLOSTROBIN es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios usados en el cultivo de soja, limón, mandarina, pomelo, naranja y vid. Para mezclas específicas consultar con nuestro departamento técnico

Derrames:
Hacer un dique con material inerte (arena, tierra, arcilla) y transferir el material líquido y sólido impregnado a envases para su destrucción. Evitar que el derrame se dirija a alcantarillas o depósitos abiertos de agua o cursos de agua

Clasificación (modo o sitio de acción): Grupo 7 + Grupo 11

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Usar máscara, guantes de vinilo, botas de goma, mameluco o delantal extra-largo durante la preparación y aplicación.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >500<2000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 8,11mg/l

Primeros auxilios:
Ingestión: no provocar el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua. Obtener asistencia médica.
Contacto con la piel: quitar la ropa contaminada. Lavar con abundante agua y jabón las zonas de la piel afectadas. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.
Contacto ocular: lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Consultar un oftalmólogo.
Inhalación: retirar al aire fresco. Si es necesario, obtener asistencia médica.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces:	Extremadamente tóxico

No aplicar en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. En aplicaciones aéreas evitar que las mismas se realicen sobre superficies acuáticas. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
PRIAXOR	BASF ARGENTINA	37924	SC	16,7% + 33,3%	II