INDAZIFLAM

Marcas comerciales: ALION - ESPLANADE.

Nomenclatura Química:
indaziflan: N-[(1R,2S)-2,3-dihidro-2,6-dimetil-1H-inden-1-il]-6-[(1RS)-1-fluoroetil]-1,3,5-triazina-2,4
Clasificación Química: alkylazinas.
Acción: inhibe la biosíntesis de celulosa.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	Momento de Aplicación
Pinos (Pinus taeda)	Achicoria (*Erechites hieracifolia)* Amor seco (*Bidens subalternans)* Bryza (*Bryza uniolae)* Cafecillo (*Senna obtusifolia)* Cebadilla criolla (*Bromus unioloides)* Cípero (*Cyperus spp.)* Comelina (*Commelina erecta)* Escoba dura (*Sida rhombifolia)* Escoba dura (*Sida spp.,sida spinosa)* Flechilla (*Piptochaetium uruguense)* Hierba mora (*Solanum nigrum)* Paja voladora (*Panicum bergii)* Paja voladora (*Panicum fultum)* Pasto chato común (*Axonopus fissifolius)* Pasto macho (*Paspalum urvillei)* Pasto pelo de chancho (*Piptochaetium montevidensis)* Pasto yacaré (*Paspalum conspersum)* Quínoa (*Chenopodium murales)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Senecio (*Senecio brasiliensis)* Setaria (*Setaria parviflora)* Vervena (*Vervena spp)* Violeta (*Hibanthus parviflorus)* Yerba de pollo (*Richardia brasiliensis)*	100 - 150 cm3/ha	Post-plantación (sobre el cultivo) en la banda de plantación y el entresurco en pre-emergencia de malezas.
Eucalipto (Eucaliptus grandis) Pinos (Pinus taeda)	Achicoria de cabra (*Erechites hieracifolia)* Amor seco (*Bidens subalternans)* Bryza (*Bryza uniolae)* Cuerno de ciervo (*Leonorus sibiricus)* Escoba dura (*Sida rhombifolia, sida spp.)* María Mola (*Senecio brasiliensis)* Pasto chato común (*Axonopus fissifolius)* Pasto macho (*Paspalum urvillei)*	100-150 cm3/ha + glifosato (75 WG) 1,5 a 2,0 kg /ha	Post-emergente de malezas en entresurco y con pantalla en la banda de plantación.

	Pasto palmera (*Setaria poiretiana)* Pasto yacaré (*Paspalum conspersum)* Pelo de chancho (*Piptochaetium montevidense, p. uruguense)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Setaria (*Setaria parviflora)* Tapecue (*Richardia brasiliensis)* Violetilla (*Hibanthus parviflorus)*		
Ciruelo Durazno Manzano Olivo Peral Vid	Achicoria silvestre (*Cichorium intybus)* Albahaca silvestre (*Galinsoga parviflora)* Amor seco (*Bidens pilosa)* Bledo o Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Capiquí (*Stellaria media)* Cardo ruso (*Salsola kali)* Cebadilla criolla (*Bromus unioloides)* Cerraja (*Sonchus oleraceus)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Cola de zorro (*Setaria spp.)* Corregüela (*Convolvulus arvensis)* Diente de león (*Taraxacum officinale)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Figue o Valda (*Flaveria bidensis)* Gramón de semilla (*Cynodon dactylon)* Lengua de vaca (*Rumex crispus)* Llantén (*Plantago major)* Malva (*Malva parviflora)* Mostacilla (*Rapistrum rugosum)* Nabillo (*Sisymbrium irio)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Papilla de la zorra (*Pitraea cuneato-ovata)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Raigrás (*Lolium multiflorum)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Roqueta, Rúcula, Oruga (*Eruca sativa)*	150-200 cm3/ha	Realizar una aplicación al inicio en la temporada, preferentemente a la salida del invierno o principios de primavera, sobre la línea de plantación, antes de la emergencia de la maleza. Si al momento de realizar la aplicación existen malezas emergidas, aplicar ALION® en mezcla con un herbicida de acción total, ya que no controla malezas emergidas. La excesiva presencia de restos de vegetales o desarrollo de malezas, sobre el suelo a aplicar, puede interferir en una distribución uniforme del producto. Lo mismo puede ocurrir con restos de poda. En caso de ser así, se mejorará la eficacia al remover este material previo a su aplicación. Evitar aplicar donde la corriente del agua pueda provocar erosión y arrastre de la lámina herbicida, ya sea laderas o pendientes muy pronunciadas, ALION® puede ser removido del mismo, lo que incidirá en el control de las malezas. Utilizar volumen de agua de 400 l/ha Procurar utilizar equipos adecuados de manera de lograr una distribución homogénea del herbicida sobre la superficie tratada. No aplique ALION en cultivos menores de 3 años.

	Roseta (*Cenchrus pauciflorus)* Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)* Trébol de olor amarillo (*Melilotus indicus)* Trébol de olor blanco (*Melilotus albus)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Verónica (*Veronica arvensis)*		
Limón Mandarino Naranjo	Altamisa (*Ambrosia tenuifolia)* Capín (*Echinochloa crus-galli)* Cebollín (*Cyperus spp.)* Eleusine (*Eleusine indica)* Flor de Santa Lucía (*Commelina spp.)* Grama Rhodes (*Chloris gayana)* Microstachis (*Microstachys spp.)* Mimosa (*Mimosa pudica)* Paja rosada (*Rinchelitrum repens)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)* Pasto miel (*Paspalum dilatatum)* Primavera (*Senecio spp.)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Rama negra (*Conyza bonariensis)* Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Yuyo colorado, Ataco (*Amaranthus quitensis)*		Aplicar siempre en mezcla con glifosato. Utilizar volumen de agua de 150 l/ha Procurar utilizar equipos adecuados de manera de lograr una distribución homogénea del herbicida sobre la superficie tratada.

Momento de aplicación:
Por su modo de acción, ALION® debe ser aplicado una vez en la temporada, previo a la emergencia de malezas, preferentemente a la salida del invierno o principios de primavera, cuando se hayan terminado las labores del interfilar y bordo. Una vez aplicado tratar de no romper la lámina del herbicida, evitando el arrastre superficial del suelo, como corrientes de agua que erosionen el suelo. Asegurarse de que el suelo este húmedo. Cuando el riego es por micro-aspersión o goteo, realizar antes la aplicación, cuando se hace por inundación o surco aplicarlo después del mismo.

Información General:

ESPLANADE y ALION son herbicidas suelo activos, no selectivos de prolongado efecto residual que controlan malezas anuales gramíneas y de hoja ancha en germinación, tanto de otoño - invierno como primavera - verano, como así algunas bianuales provenientes de semillas. Su ingrediente activo, indaziflam, pertenece al grupo químico de las alkylazinas y actúa inhibiendo la biosíntesis de celulosa en las malezas que están emergiendo en contacto con la lámina de los herbicidas.

Instrucciones de uso:
Llenar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad, poner a funcionar el retorno o los agitadores, agregar el producto y completar la carga de agua. No detener el retorno o los agitadores pues, por tratarse de una formulación en suspensión concentrada, el producto puede decantar.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
ALION® puede ser aplicado luego del tercer año de plantación, con cualquier equipo terrestre convencional dotado de un sistema de agitación adecuado y provistos de picos con pastillas anti-deriva con conducción de aire para evitar la deriva. En frutales de carozo, vides y frutales de pepita, se recomienda un caudal de 400 l/ha y de 150 l/ha para cítricos, para lograr un buen cubrimiento homogéneo de la superficie a tratar. No aplicar con vientos fuertes, no realizar aplicaciones aéreas ni por vías de riegos tecnificados
La aplicación ESPLANADE™ se puede realizar con cualquier equipo portátil previamente calibrado tipo mochila dotado de un sistema de agitación adecuado y provisto de picos con pastillas anti deriva, con conducción de aire para evitar la deriva. Se recomienda un caudal de 180 l/ha, para lograr un cubrimiento homogéneo de la superficie a tratar. No aplicar con vientos fuertes, no realizar aplicaciones aéreas.

Restricciones de uso:
Producto de uso posicionado.

No reingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No realizar aplicaciones por contacto directo sobre el follaje, corteza verde, raíces o frutos. Evitar aplicar con exceso de viento, ya que la deriva podría afectar a otros cultivos. Aplicar de acuerdo a las Buenas Prácticas Agrícolas.
-No aplicar en plantaciones en mal estado nutricional y/o estrés hídrico.
-No aplicar en presencia de heladas ni sobre suelos que presenten agua en estado de congelación.
-Evitar aplicar con exceso de viento, con velocidades superiores a 16 km/h, ya que la deriva podría afectar a otros cultivos.
-Cuando se produce depresión del suelo, por transplante, deberá nivelar previo a la aplicación de ESPLANADE y ALION.
-Al momento de realizar replantes, remover la capa superficial del suelo aplicado y rellenar el hoyo de plantación con suelo sin tratar. Para el replante de todo un lote deberán haber transcurrido al menos 12 meses desde la última aplicación de ESPLANADE y ALION, y previo a la nueva plantación de deberá hacer una labranza profunda para invertir la capa superficial del suelo tratado. No rotar con cultivos anuales sino hasta después de 2 años después de la última aplicación de ESPLANADE y ALION.
-Evitar que la aplicación entre en contacto directo o indirecto con corteza no lignificada, ya que puede producirse daño localizado.
-No aplicar en huertos frutales cuyos árboles presentan raíces expuestas a la aplicación.
-Evitar labores mecánicas (como el desorillado) que promuevan el contacto directo de la aplicación con las raíces del cultivo.
- ESPLANADE No realizar más de dos aplicaciones en un período de 12 meses en la dosis recomendada (no superar en un período de 12 meses más de 150 g de ingrediente activo indaziflam/ha). De realizar dos aplicaciones, se debe mantener un intervalo de 3 meses entre aplicación.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes, de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): L (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 50%

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >= 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >= 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (conejo):	CL50: >= 1.937 mg/l
Irritación dermal (conejo):	No irritante
Irritación ocular (conejo):	No irritante
Sensibilización dermal (ratón):	No sensibilizante

Riesgos ambientales

Ligeramente toxico para aves.
Muy toxico para organismos acuáticos. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre la aplicación y el curso de agua. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización.
Virtualmente no toxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ALION	BAYER	37573	SC	50%	III
ESPLANADE	BAYER	37710	SC	50%	III