SPIROTETRAMAT

Marcas comerciales: MOVENTO.

Nomenclatura Química:
spirotetramat: ester etilíco del ácido carbónico 3-[2,5-dimetilfenil] - 8 metoxy -2-oxo - 1 azaspiro (4,5) dec - 3-en-4 -yl.
Clasificación Química: derivado del ácido tetrónico y tetrámico.
Acción: ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Uva de mesa Uva para vino	Cochinilla harinosa (*Planococcus ficus)*	70 - 90 cm3/hl	21	Aplicar preferentemente en forma temprana entre el periodo de floración a cuaje, cuando se producen las migraciones de las ninfas móviles hacia la base de los pitones y brotes nuevos. Se recomienda la mayor dosis para las variedades más tardías, a fin de lograr la residualidad necesaria.
Peral	Cochinilla harinosa (*Pseudococcus viburni.)*	70 cm3/hl	14	Realizar 1 aplicación en forma temprana en cuaje de frutos hasta fruto chico, esto es generalmente entre mediados de octubre - principios de noviembre antes de que se produzca la migración de las primeras ninfas móviles, de la primera generación, hacia los brotes y frutos.
Pimiento Tomate	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)* Mosca blanca de los invernáculos (*Trialeurodes vaporariorum)*	60 cm3/hl	2	Aplicar en aspersión foliar al observar la presencia de la plaga o cuando se supere el umbral de 5 ninfas por folíolo. Por su doble sistemia MOVENTO® actúa mayormente a nivel de ninfas.
Manzano	Piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus)*	50 - 70 cm3/hl	14	Aplicar en forma temprana, con suficiente follaje, antes que se den los nacimientos de ninfas de la primera generación, o bien de acuerdo al servicio de alarma.
	Pulgón lanígero (*Eriosoma lanigerum)*			Aplicar en forma temprana, preventivamente, con suficiente follaje, en plantas con pie susceptible o al observar las primeras colonias aéreas. Por su doble sistemia, MOVENTO® tiene control sobre pulgones que se encuentran en las agallas radicales, para ello emplear la mayor dosis.
Pimiento	Pulgon verde (*Myzus persicae)*	50 cm3/hl	2	Aplicar en aspersión foliar al observar la presencia de la plaga
Ciruelo Durazno Nectarina	Pulgón verde del duraznero (*Myzus persicae)*		14	Aplicar en forma temprana, después de caída de pétalos y con la aparición de los primeros pulgones. MOVENTO® actúa en forma lenta y presenta un largo poder residual.
Limón (*) Naranja (*)	Psilido (*Diaphorina citri*)	70 - 100 ml/hl o 1190 - 1700 l/ha	1	Aplicar preferentemente cuando los brotes nuevos tengan de 4 a 6 días y las ninfas de Diaphorina estén en N1-N3.

(*) Limón y Naranja: La dosis máxima recomendada de Movento es 1.190 ml/ha. En plantas muy voluminosas puede aplicarse 70 ml/hl con un volumen de caldo máximo de 1.700 litros/ha. En plantas jóvenes con poco desarrollo puede utilizarse 100 ml/hl con un volumen de caldo máximo de 1.190 litros/ha.
Pueden realizarse dos aplicaciones al año, con un intervalo de 21 días hasta 1 día antes de cosecha. El límite máximo de activo por hectárea al año es de 347 gramos.

Información General:

Spirotetramat actúa en la plaga objetivo principalmente a través de la ingestión. Por lo tanto, la eficacia biológica completa depende la penetración de la sustancia activa en los tejidos foliares y translocación generalizada dentro de la planta. Por su modo de acción de doble sistemia, MOVENTO® posee la propiedad de poder translocarse vía acropétala a través del xilema, y simultáneamente vía basipétala y acropétala vía floema.
La penetración y sistemicidad - y por lo tanto la eficacia - se puede reducir si las aplicaciones se realizan durante periodos de estrés fisiológico de los cultivos (por ejemplo, por causa de bajas temperaturas o sequías), o cuando las plantas no están creciendo activamente. Por lo tanto, spirotetramat funciona mejor si se aplica a follaje verde y ramas jóvenes con activo crecimiento. Por otra parte, una buena cobertura de la parte inferior de las hojas asegurará una óptima penetración y translocación del ingrediente activo.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Para durazno, nectarines y ciruelo: se recomienda las aplicaciones con equipos terrestres de Alto volumen. Emplear un volumen mínimo de agua de 1500 l/ha ajustado el mismo de acuerdo al TRV y tipo de conducción del monte, con el fin de lograr el completo mojado de las plantas.
Para manzano y peral: se recomienda las aplicaciones con equipos terrestres de Alto volumen. Emplear un volumen mínimo de agua de 2000 l/ha ajustando el mismo de acuerdo al TRV y tipo de conducción del monte, con el fin de lograr el completo mojado de las plantas
Para tomate y pimiento: se recomienda las aplicaciones con mochila pulverizadora manual o a motor, maquina a manguera o turbina. El volumen de agua a aplicar por hectárea puede variar entre los 600 y los 1500 litros, ajustando el mismo al desarrollo del cultivo con el fin de lograr, en todos los casos el completo y correcto mojado de las plantas, evitando el escurrimiento.
Para vid: se recomienda las aplicaciones con equipos terrestres de Alto volumen. Emplear un volumen mínimo de agua de 1000 l/ha ajustando el mismo de acuerdo al tipo de conducción y desarrollo del cultivo, con el fin de lograr el completo mojado de las plantas.

Restricciones de uso:

Evitar las horas de mayor insolación y menor humedad relativa, ya que se produce la evaporación del agua utilizada como vehículo en el caldo de aplicación. Se recomienda no aplicar con menos de 50% de HR (Humedad Relativa). La temperatura no debe sobrepasar los 30-35 °C y vientos no mayores a 12 Km/h. Verificar el correcto funcionamiento de los agitadores del equipo de aplicación. Es importante lograr un buen mezclado del vehículo (agua) con el producto, para que la dosis aplicada sea homogénea en toda la superficie.
No reingresar al área tratada durante las 24 horas posteriores a la aplicación del producto.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados para su posterior destrucción. La destrucción deberá realizarla una empresa especializada para tal fin.

Clasificación (modo o sitio de acción): 23 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Se recomienda utilizar delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del formulado 15%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: >= 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: 842 mg/m3

Irritación dermal: Leve irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Riesgos ambientales
Prácticamente no tóxico para aves.
Moderadamente toxico para organismos acuáticos. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre la aplicación y el curso de agua. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización.
Virtualmente no toxico para abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MOVENTO	BAYER	37633	SC	15%	III