IODOSULFURON METIL SODIO + MESOSULFURON METIL

Marcas comerciales: HUSSAR PLUS.

Nomenclatura Química:
iodosulfuron metil sodio: metil 4 iodo 2 [3 (4 metoxi-6-metil-1,3,5, triazin-2- il) ureidosulfurfonil] benzoato.
mesosulfuron metil: ácido 2-[4,6-dimetoxipirimidin- 2-ilcarbamoil)sulfamoil]-a-metanosulfonamida)-p-toluico
Clasificación Química: sulfonilurea + sulfonilurea.
Acción: sistémica y foliar.

Uso: herbicida.

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Cebada Trigo	Alpiste (*Phalaris canariensis)* Avena negra o Cebadilla (*Avena fatua)* Bolsa del pastor (*Capsella bursa pastoris)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos, Sanguinaria (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Falsa biznaga (*Ammi majus)* Flor morada (*Echium plantagineum)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Manzanilla (*Matricaria chamomilla)* Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Ortiga mansa (*Lamium amplexicaule)* Pasto de Invierno, Poa (*Poa annua)* Pensamiento silvestre (*Viola arvensis)* Perejilillo (*Bowlesia incana)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Raigrás (*Lolium multiflorum)* Verónica (*Veronica arvensis)*	220 a 240 cm3/ha Hussar Plus + 5 g/ha metsulfuron metil 60 % + 0,2% v/v de alcohol alcoxilado	70	Bajo condiciones normales, una aplicación por año es suficiente. HUSSAR PLUS® debe ser aplicado cuando la mayoría de las malezas han emergido y están entre 2 y 4 hojas (para malezas monocotiledóneas) o seis hojas (para malezas dicotiledóneas). De ésta forma se reduce la competencia de las malezas con el cereal. Para un control y manejo efectivo de Lolium spp y Avena fatua, HUSSAR PLUS debe aplicarse cuando la densidad de estas especies sea inferior a 150 plantas por m2 de superficie.

Información General:

HUSSAR PLUS® es un herbicida post-emergente selectivo de uso en cereales, perteneciente al grupo de las sulfonilureas. Actúa sobre un amplio espectro de gramíneas y algunas dicotiledóneas.
Por su modo de acción interfiere a nivel de la enzima "aceto lactato sintetasa" (ALS).
Es un herbicida sistémico. Se transloca tanto por floema como por xilema. Su principal acción es foliar.

Instrucciones para el uso
HUSSAR PLUS® está formulado como suspensión concentrada en base aceite. Llene la pulverizadora con agua hasta la mitad de su volumen, agregue la cantidad necesaria de HUSSAR PLUS® directamente en el tanque y complete el llenado con agua. Es recomendable mantener los agitadores o el retorno en actividad durante la preparación del caldo y la aplicación. Debe evitarse dejar el caldo preparado sin agitación, pues el producto puede precipitarse.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
HUSSAR PLUS® puede ser aplicado con las pulverizadoras convencionales de bajo volumen, ya sean de arrastre como autopropulsadas, siempre que estén provistas de un agitador adecuado. En caso de no contar con este implemento, la bomba deberá ser capaz de producir un exceso de flujo, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.

Es importante lograr un correcto mojado de las malezas, con una distribución uniforme de 30 a 40 gotas/cm2 con un coeficiente de variación menor a un 30%.

El volumen de aplicación deberá ser de 80 a 120 l/ha, trabajando a una presión de 35 a 45 lb/pulg2, con pastillas de abanico plano y ángulo de pastillas entre 80° y 110°. Debe evitarse toda posible deriva a cultivos cercanos sensibles al herbicida.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (Ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes, de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) + B (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
En aplicaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel. Durante la preparación y la aplicación use guantes, sombrero o casco, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los banderilleros. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

Información Toxicológica:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 2.000 mg/kg
Irritación dermal (conejo):	Severo irritante
Irritación ocular (conejo):	Severo irritante
Sensibilización dermal (ratón):	No sensibilizante
Riesgos ambientales	
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces:	Moderadamente tóxico

No contaminar fuentes ni cursos de agua, aguas de riego ni receptáculos de agua.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
HUSSAR PLUS	BAYER	37218	OD	5% + 0,78%	III