DIFENOCONAZOLE + FLUDIOXONIL + SEDAXANE

Marcas comerciales: BAROVA GOLD - COMPINCHE SX (*) - EXTALIOM GOLD - VIBRANCE GOLD.

Nomenclatura Química:
difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazol
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
sedaxane: mezcla de 2 cis-isómeros 2´-[(1RS,2RS)-1,1´-bicicloprop-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metilpyrazole-4-carboxanilida y 2 trans isómeros 2´-[(1RS,2SR)-1,1´-bicicloprop-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metilpyrazol-4-carboxanilida
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazol + fenilpirrol + pirazol - carboxamida - SDHIs.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida y terápico para el tratamiento de semillas.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Arroz	Enfermedades causadas por patógenos del suelo y la semilla *(Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Pyricularia sp.)*	200-300 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas. (200-250 cm3 formulado+ 800-750cm3 agua).
Trigo	Carbón cubierto (*Tilletia laevis =tilletia foetida)* Carbón volador (*Ustilago nuda f. sp. tritici)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Enfermedades de semillas y suelo (*Alternaria spp)* Enfermedades de semillas y suelo (*Fusarium graminearum)* Enfermedades de suelo y semilla (*Cladosporium spp.)* Mancha amarilla *(***)* (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana)* Roya amarilla o lineal *(Puccinia striiformis f.sp.tritici) (**)* Roya de la hoja *(Puccinia triticina) (**)*	200-250 cm3/100 kg de semilla		
Cebada	Carbón Volador *(Ustilago nuda)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Enfermedades de semillas y suelo (*Alternaria spp)* Enfermedades de semillas y suelo (*Fusarium graminearum)* Enfermedades de semillas y suelo (*Aspergillus spp.)* Enfermedades de semillas y suelo (*Fusarium spp.)* Enfermedades de semillas y suelo (*Penicillium spp.)* Enfermedades de semillas y suelo (*Rhizopus spp)* Enfermedades de suelo y semilla (*Cladosporium spp.)* Escaldadura (Rynchosporium secalis) (**) Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana) (***)* Mancha en red de la cebada *(Drechslera teres) (***)*			

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
(**) Disminución de Incidencia y Severidad hasta encañazón (Zadocks 3)
(***) Control de enfermedades en semilla y disminución de Incidencia y Severidad hasta encañazón (Zadocks 3).

Información General:

Es un fungicida-insecticida terápico para el tratamiento de semillas de cebada y trigo. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades e insectos que afectan al cultivo durante su implantación.

Combina en su formulación la acción de tres principios activos, otorgando acción fungicida, sin afectar el poder germinativo de las semillas tratadas.
Los tres fungicidas que lo conforman poseen modos de acción complementarios:
-difenoconazole (triazol), es absorbido por raíces y traslocado a través de la plántula, ejerciendo acción sistémica y translaminar. Actúa inhibiendo el desarrollo subcuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.
-fludioxonil (fenilpirrol) actúa por contacto, interfiriendo en el proceso de regulación osmótica través de la inhibición de la proteína quinasa. La combinación de ambos otorga un amplio espectro de control y persistencia de acción, protegiendo al cultivo de patógenos que afectan a las semillas y plántulas durante la implantación.
- sedaxane (pirazol-carboxamida-SDHIs) es un inhibidor de la respiración (complejo II). Inhibe el metabolismo fúngico por unión con la enzima succinato deshidrogenasa (SDH, complejo II en la cadena de respiración mitocondrial), la cual es parte funcional del ciclo tricarboxílico y está vinculada a la cadena de transportes de electrones en la mitocondria.
Posibilitan una mejor emergencia y sanidad integral de las plántulas de cebada y trigo, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo.

Preparación:
Se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente del formulado sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas.

Cebada
- 200-250 cm3 formulado + 800-750 cm3 agua

Trigo
- 200-250 cm3 formulado + 800-750cm3 agua

Arroz
- 200-250 cm3 + 800-750 cm3 agua

Volumen de Dilución de la Cebada, Trigo y Arroz
- 1000 cm3/100 kg de semillas

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
-Agitar el producto antes de abrir el envase.
-Agregar luego la cantidad necesaria según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
-Adicionar otros productos compatibles uno a la vez, manteniendo constante la agitación y corroborando la correcta dilución.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Es una suspensión concentrada para ser aplicada en forma de dilución sobre las semillas de cebada y trigo. Para obtener una buena protección del cultivo es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando la cobertura uniforme de cada semilla.
Debe ser aplicado por medio de un equipo adecuado para el tratamiento de semillas. No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente. Asegurar que la semilla quede coloreada luego del tratamiento.

Restricciones de uso:
La semilla tratada con se distingue claramente por su tonalidad rojiza, dada por el colorante que contiene la formulación. La semilla que ha sido tratada debe ser usada exclusivamente para la siembra y nunca utilizada para alimentación humana o animal, ni para la industria. Tratar únicamente la semilla a sembrar, evitando sobrantes de semilla curada.

Período de carencia: exento para el uso como terapia de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Resistencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad contra estas posibles cepas resistentes. Para evitar la generación de resistencia deben implementarse estrategias como la rotación o mezclas con fungicidas de diferente modo de acción.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS
El producto formulado pertenece al grupo 3, 12 y 7 de los fungicidas.

Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 3 (FRAC) + 12 (FRAC) + 7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El tratamiento debe realizarse en áreas bien ventiladas. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipulación (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: > 2000mg/kg
DL 50 dermal para ratas: > 2000mg/kg
CL50 inhalación aguda: > 5,11 mg/l (ratas)

Leve irritante dermal (Conejo). Moderado irritante ocular (Conejo). No sensibilizante dermal (Cobayo de guinea).

Síntomas de intoxicación aguda: no se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Es virtualmente no tóxico para abejas, y debido a su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Es ligeramente tóxico para peces. Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es prácticamente no tóxico para aves.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Si quedara semilla tratada con el producto, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
COMPINCHE SX (*)	SYNGENTA AGRO	38122	FS	2.5% + 2.5% + 5%	III
BAROVA GOLD	SYNGENTA AGRO	40086	FS	2,5 + 2,5 + 5%	III
EXTALIOM GOLD	SYNGENTA AGRO	40220	FS	2,5% + 2,5%+ 5%	III
VIBRANCE GOLD	SYNGENTA AGRO	37906	FS	2.5% + 2.5% + 5%	III

(*) Distribuido por RIZOBACTER ARGENTINA S.A.

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.