FLUDIOXONIL + METALAXIL- M + BRADYRHIZOBIUM SPP.

Marcas comerciales: FUNCION PACK - FUNCION PACK HC.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2'-metoxiacetil)-D-alanina metil éster
Bradyrhizobium spp.

Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fertilizante biológico líquido de aplicación directa, fungicida y terápico para el tratamiento de semillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Pythium spp.)* Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Phytophtora spp.)* Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Penicillium spp.;)* Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Fusarium spp.)* Dumping off y Enfermedades de las raíces (*Rhizoctonia spp.)* Hongos de la semilla (*Phomopsis spp.)* Hongos de la semilla (*Alternaria sp.)* Hongos de la semilla (*) (*Cercospora sojina)* Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos de la semilla, Mancha púrpura (*Cercospora kikuchii)*	100 cm3/100 kg de semillas (PF) + 300 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico Ekey top) O 200 cm3/100 kg de semillas (fertilizante biológico Ekey top HC)	(**)	Aplicar en forma de dilución a las semillas, respetando las dosis recomendadas según el cultivo y la cantidad de semillas a tratar.

(*) Control parcial
(**) Se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas

Información General:

El producto está compuesto por dos fungicidas más un fertilizante o inoculante biológico.
Los fungicidas son utilizados como terápicos para el tratamiento de semillas de soja. Protegen la germinación y el desarrollo inicial del cultivo, permitiendo el establecimiento de un stand de plantas óptimo.
Contiene en su formulación dos principios activos con dos modos de acción distintos. Otorga control sobre varias enfermedades, actuando tanto contra el "dumping-off" y enfermedades de las raíces, y hongos de la semilla.
Este producto puede formar parte de un Programa de Manejo Integrado de Plagas.
El fertilizante biológico está elaborado con cepas de bacterias fijadoras de nitrógeno especialmente seleccionadas. Este producto contiene al momento de elaboración 1x10 exp10 bacterias/cm3, y a la fecha de vencimiento 1x10 exp9 bacterias/cm3 y 2x10 exp9 en el producto HC, cuando el producto es almacenado en las condiciones recomendadas.

Preparación FUNCION PACK:
Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
Colocar en un recipiente limpio el contenido de un sachet de 3 litros de fertilizante biológico.
Agregar 1 litro de producto formulado, revolver durante algunos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Leer atentamente las indicaciones del marbete del producto.
La totalidad de la mezcla, 4 litros alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
Con el recipiente dosificador puede medir 200 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semilla de soja.

Preparación FUNCION PACK HC:
Procedimiento básico para inocular 1.000 kg de semillas de soja:
Colocar en un recipiente limpio el contenido de un sachet de 2 litros de fertilizante biológico.
Agregar 1 litro de producto formulado, revolver durante algunos segundos hasta lograr una mezcla homogénea. Leer atentamente las indicaciones del marbete del producto.
La totalidad de la mezcla, 3 litros alcanzan para inocular y proteger 1.000 kg de semilla de soja.
Con el recipiente dosificador puede medir 150 cm3 de la mezcla para inocular 50 kg de semilla de soja.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
La aplicación del producto formulado (proceso de inoculación más el tratamiento de las semillas con fungicida) deberá llevarse a cabo en lugares donde no incida la radiación solar directa. Mezclar el producto con las semillas en las dosis indicadas

mediante la utilización de máquinas destinadas a tal fin hasta la obtención de una cobertura uniforme y homogénea. Asegurando que cada semilla quede cubierta adecuadamente. Dejar secar unos minutos y proceder a la siembra.
No aplicar el producto formulado directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente.

Recomendaciones de uso:

Es aconsejable realizar la inoculación en máquinas especiales para el tratamiento de semillas, lo cual permite obtener una distribución y cobertura uniformes del producto sobre las semillas.
Una vez preparada la mezcla de fertilizante biológico + producto formulado, realizar la inoculación en forma inmediata.
El fertilizante biológico ha sido elaborado con Tecnología Osmo Protectora (TOP), permitiendo ampliar el tiempo de siembra de la semilla tratada.
Todo el procedimiento de inoculación debe realizarse en sitios donde no incida directamente la radiación solar.
Mantener las semillas inoculadas a la sombra, no exponerlas a temperaturas mayores a 25 °C.
Realizar la calibración de la sembradora con la semilla tratada.

Restricciones de uso:
Periodo de carencia: se halla exento de período de carencia para el uso como terápico de semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Atención: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal, por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad:
Es compatible con polímeros para recubrimiento de semillas y con polvos dispersables o suspensiones concentradas para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones basadas en solventes orgánicos. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad:
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): E2:12 (FRAC) + A1:4 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección, puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante de producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Producto formulado Funcion Pack:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >5500 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	LC50: >4,42 mg/l
Irritación dermal:	Levemente irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Fertilizante biológico:
Producto no tóxico

Producto formulado Funcion Pack HC:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: >5050 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: >5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda:	LC50: >5,42 mg/l

Irritación dermal: Levemente irritante
Irritación ocular: Moderado irritante
Sensibilización dermal: Sensibilizante. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

Fertilizante biológico:
Producto no tóxico

Advertencias para el médico:
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática. La administración de una suspensión de carbón activado puede favorecer la eliminación del tóxico y limitar su absorción desde el tracto digestivo.

Riesgos ambientales:

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Ligeramente tóxico

No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Las semillas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y quedar completamente cubiertas por el suelo. Las semillas sobrantes no deben ser usadas como alimento para aves u otros animales. Si quedara semilla tratada, recogerla o enterrarla para evitar que sea ingerida por las aves u otros animales. Debe tomarse la precaución de no contaminar posibles fuentes de bebida con remanentes del producto ni del equipo de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FUNCION PACK	SYNGENTA AGRO	PACK N°166	FS + Fertilizante biológico	2,5% + 3,75%	IV
FUNCION PACK HC	SYNGENTA AGRO	PACK N°325	FS + Fertilizante biológico	2,5% + 3,75%	IV