IMIDACLOPRID + SPIROTETRAMAT

Marcas comerciales: MOVENTO PLUS.

Nomenclatura Química:
imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridil -metil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamida
spirotetramat: éster etilíco del ácido carbónico 3-[2,5-dimetilfenil] - 8 metoxy -2-oxo - 1 azaspiro (4,5) dec - 3-en-4 -yl
Clasificación Química: neonicotinoide + derivado del ácido tetrónico y tetrámico.
Acción: de contacto, sistémica e ingestión.

Uso: insecticida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Poroto	Mosca blanca (*Bemisia tabaci)*	200 - 250 cm3/ha	30	Ante la aparición de los primeros individuos en el lote. Usar la dosis máxima, cuando el nivel de plaga sea elevado
Algodón (*)	Mosca blanca (*Bemisia spp.)* Pulgón del algodonero (*Aphis gossypii)*		65	

(*) Agregar 500 cm3/ha de aceite mineral o 250 cm3/ha de Optimizer

Información General:

MOVENTO PLUS tiene acción por contacto e ingestión.
El producto formulado insecticida MOVENTO PLUS está compuesto por dos ingredientes activos: spirotetramat e imidacloprid.
Spirotetramat actúa en la plaga objetivo principalmente a través de la ingestión. Por lo tanto, la eficacia biológica completa depende la penetración de la sustancia activa en los tejidos foliares y translocación generalizada (xilema y floema) dentro de la planta.
La penetración y sistemicidad - y por lo tanto la eficacia - se puede reducir si las aplicaciones se realizan durante periodos de estrés fisiológico de los cultivos (por ejemplo, por causa de bajas temperaturas o sequías), o cuando las plantas no están creciendo activamente. Por lo tanto, spirotetramat funciona mejor si se aplica a follaje verde y ramas jóvenes con activo crecimiento. Por otra parte, una buena cobertura de la parte inferior de las hojas asegurará una óptima penetración y translocación del ingrediente activo.
Spirotetramat es un insecticida que actúa como inhibidor de la síntesis de los lípidos, y es especialmente activo en formas juveniles. Está clasificado como "Derivados del ácido tetrónico y tetrámico" por el IRAC (Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas), perteneciendo al grupo 23 en la mencionada clasificación.
Imidacloprid pertenece al grupo químico de los "Neonicotinoides". Como tal, es un antagonista de receptores de acetilcolina, perteneciendo al grupo 4A del IRAC.
Imidacloprid posee sistemia "acrópeta", es traslocado por xilema y es activo tanto en formas adultas como juveniles.

RESTRICCIONES DE USO:
Dejar pasar el siguiente período entre aplicación y cosecha:
Poroto: 30 días
Algodón: 65 días
"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el limite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Manejo antiresistencia:
El uso reiterado e indiscriminado de cualquier insecticida, puede llevar a la sobrevivencia y multiplicación de individuos dentro de la población de insectos objetivo, que son naturalmente resistentes al mismo, propiciando de esta manera la predominancia de aquellos insectos resistentes; con la consecuente pérdida de efectividad del producto o familia de producto en cuestión.
Por lo tanto, para minimizar el riesgo que implica un mal manejo de estas familias de insecticidas (ketoenoles; Grupo 23 y neonicotinoides, Grupo 4A) se recomienda la siguiente estrategia:

En el caso que se pueda determinar claramente el comienzo y fin de una generación de la plaga; no realizar más de 2 aplicaciones de Movento Plus o cualquier otro insecticida que contenga ketoenoles y/o neonicotinoides (grupo 23 y 4A de IRAC) por generación de dicha plaga. La siguiente generación se debe controlar con un producto de diferente modo de acción.

En aquellas situaciones adonde no sea posible determinar las generaciones con presición, utilizar el criterio de ventanas activas (aplicación) y ventanas inactivas (no aplicación). Esto significa que en un período de 30-40 días pueden realizarce hasta 2 aplicaciones de Movento Plus, y en los 30-40 días sucesivos no debe aplicarse Movento Plus ni ningún otro insecticida que contenga ketoenoles y/o neonicotinoides; rotando con insecticidas de otras familias con modos de acción diferente.

Compatibilidad:
MOVENTO PLUS es compatible con la mayoría de los insecticidas comúnmente usados. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de formulaciones de MOVENTO PLUS con otros pesticidas en tanque, se compruebe su compatibilidad física al mezclarlos en un recipiente pequeño.

Fitotoxicidad:
No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material adsorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Luego lave con abundante agua y jabón el área contaminada.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (IRAC) + 23 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:
DL 50 oral aguda en rata: > 500 mg/kg.
DL 50 dermal aguda en rata: > 2000 mg/kg.
CL 50 inhalatoria en rata: 2584 mg/m3 aire

Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Riesgos ambientales:
Es moderadamente tóxico para aves. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas.
Moderadamente tóxico para organismos acuáticos. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el remanente sobre el lote tratado o los accesos al mismo.
Altamente tóxico para abejas: Ante la presencia de colmenas en el área circundante al lote a tratar, debe darse aviso al apicultor responsable con la antelación suficiente para que éste pueda retirar las mismas y trasladarlas a una distancia equivalente al máximo vuelo de las abejas. Igualmente, y con el objetivo de minimizar el riesgo de exposición para las abejas, no aplicar el producto previo o durante la floración. No utilizar cuando las abejas se encuentran en época de alimentación activa. Se recomienda, antes de aplicar el producto, eliminar las malezas que estén florecidas al momento de la aplicación y/o cortar la cubierta vegetal presente en o alrededor del cultivo si han alcanzado la fase de floración.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
MOVENTO PLUS	BAYER	37384	SC	36% + 12%	II