PICOXYSTROBIN + PENTIOPIRAD

Marcas comerciales: ORLIAN.

Nomenclatura Química:
picoxystrobin: metil (E)-2-[2-(6-trifluorometilpiridin-2-iloximetil)-fenil]-3-metoxyacrilato
pentiopirad: (RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-tiofen-3-il]-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida
Tipo de producto: químico
Clasificación Química: estrobilurina + carboxamida.
Acción: sistémica, preventiva y curativa.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol	Escudo negro o Mancha negra del tallo (*Phoma macdonaldii)*	700 - 800 cm3/ha (*) + Quid® Oil 250 cm3/ha (**)	70	Realizar la aplicación con la aparición de los primeros síntomas, a partir de R1 (estrella o botón floral visible).
Soja	Mancha marrón (*Septoria glycines)* Mancha ojo de rana (*Cercospora sojina)* Tizón de la hoja (*Cercospora kikuchii)*		30	Aplicar al observar la presencia de los primeros síntomas.
Maní	Viruela tardía (*Cercosporidium personatum)* Viruela temprana (*Cercospora arachidicola)*		35	Aplicar al observar los primeros síntomas de la enfermedad. En caso de persistir condiciones favorables y aparecer nuevas pústulas, realizar nuevas aplicaciones aproximadamente cada 21-28 días, de acuerdo a la tasa de crecimiento del cultivo.

(*) Utilizar la dosis mayor cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de enfermedad. Caso contrario puede utilizarse la dosis menor.
(**) Para obtener mayor estabilidad y consistencia en los resultados de control se recomienda el agregado del coadyuvante Quid® Oil (u otro a base de aceite vegetal metilado siliconado) o aceite mineral refinado a sus respectivas dosis de marbete. Puede también utilizarse el coadyuvante Nimbus a una dosis de 500 cm3/ha

Información General:

Es un fungicida de uso agrícola con propiedades sistémicas, acción preventiva, curativa post-infectiva y efecto residual, para el control de enfermedades en los cultivos de maní y girasol. Combina la acción de dos principios activos, pentiopirad y picoxystrobin, que inhiben la germinación de esporas y tienen efecto de persistencia de control.
Controla patógenos de las clases de los ascomicetes y basidiomicetes, actuando como un inhibidor de la respiración mitocondrial de las células de los hongos, interfiriendo así en el ciclo de vida de los mismos, principalmente en los procesos de germinación de las esporas. Se mueve en forma translaminar y acropétala dentro de las hojas y posee movimiento sistémico vía xilema.

Preparación

El producto está formulado como una suspensión concentrada. Para su preparación se aconseja seguir los siguientes pasos:

1-Verificar que el equipo esté perfectamente limpio.
2-Cargar el tanque del equipo con agua limpia y filtrada, hasta la mitad de su capacidad y poner el agitador en marcha.
3-Agregar el volumen necesario de producto según la superficie a tratar y dosis a aplicar; incorporar el producto lentamente al tanque sin disolución previa, evitando salpicaduras.
Cuando se realicen mezclas de tanque, los polvos mojables y granulados dispersables deben agregarse al tanque antes; productos con otras formulaciones deben agregarse luego y solo después que éste se haya suspendido completamente.
Para una mayor consistencia del tratamiento se recomienda el uso de un coadyuvante a base de aceite vegetal metilado siliconado o aceite mineral refinado a las dosis recomendadas en sus marbetes. También puede utilizarse el aceite mineral parafínico 42.8% a una dosis de 500 cm3/ha de caldo de aplicación.
4-Completar la carga de agua del tanque y agitar mediante el retorno de la bomba hasta lograr una suspensión homogénea.
Preparar únicamente lo estimado para aplicar en el día. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

Equipos, volumen y técnicas de aplicación

El producto debe aplicarse al cultivo con el volumen necesario para lograr una buena cobertura. Se recomienda utilizar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo, a fin de lograr una excelente cobertura del mismo; evitar que se produzca escurrimiento del mismo por exceso de agua.
-En aplicaciones terrestres se deben utilizar caudales no inferiores a 150 litros de agua por hectárea, trabajando con una presión de 40-50 lb/pulg2 para lograr una buena penetración del producto y mojado del cultivo.
Es recomendable una aplicación que logre una distribución uniforme de gotas en la superficie foliar y cuyo tamaño sea lo más homogéneo posible. Los picos más aptos para tal fin son los de cono hueco o de doble abanico plano, que producen gotas de entre 100 y 250 micrones. Se deben lograr 30 gotas/cm2 de la superficie foliar.
Antes de aplicar calibrar el equipo con agua, a velocidad y presión constantes.
-Con equipos aéreos se debe utilizar un caudal no menor de 20-30 l/ha, calibrando el equipo para asperjar 30 gotas/cm2. No aplicar utilizando gas oil.
Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/h.

Compatibilidad: Es compatible con otros productos recomendados para los cultivos indicados en esta etiqueta y de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes (especialmente las de aquel producto que tenga limitaciones y precauciones más restrictivas). No obstante, no realizar ninguna mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo.

Advertencias
Es un fungicida exclusivamente para uso agrícola. No utilizar en cultivos ornamentales, hidropónicos o cualquier otro uso distinto de lo específicamente indicado en esta etiqueta.
No debe aplicarse en cultivos sometidos a estrés producto de sequías, bajas temperaturas, ataque de insectos, deficiencias minerales, etc. Tampoco debe aplicarse si se prevén lluvias dentro de las tres horas luego de la aplicación.

Manejo de Resistencia
Cuando se utilizan repetidamente fungicidas de un mismo modo de acción para controlar las mismas enfermedades en la misma zona, puede ocurrir la aparición de razas o patotipos resistentes que pueden sobrevivir, propagarse y volverse dominantes. Prácticas tales como el uso alternado o la mezcla de fungicidas de distinto modo de acción, o el uso de fungicidas que combinan ingredientes activos con distinto modo de acción, evitan o demoran la proliferación de tales patotipos.
Máximo número de tratamientos por ciclo: girasol: 1 aplicación; maní: 3 aplicaciones.

Derrames:
Producto sin preparar o caldo de pulverización: mantener alejados a personas y animales. No fumar. Contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, tierra) y recogerlo con pala conjuntamente con la capa superficial de suelo afectado. En ambos casos colocar el material recogido en tambores rotulados y cubrirlo totalmente con una solución al 1% de agua amoniacal (1 litro cada 100 litros de agua) para su posterior destrucción por empresas autorizadas.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (FRAC) + 7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para la carga del equipo pulverizador y aplicación del producto, debe utilizarse máscara protectora de vías respiratorias y ojos (con filtro adecuado), gorra con protección para la nuca, camisa de mangas largas y pantalones largos -o enterizo de Tyvek®- botas de gomas y guantes resistentes a químicos (barreras laminadas o de goma de nitrilo o butilo).

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 1750 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria (rata):	CL50: > 1,5 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	Sensibilizante

Tratamiento: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces:	Muy tóxico

Precauciones ambientales

Deben extremarse los cuidados para evitar la contaminación directa de los cuerpos de agua ya sea durante la aplicación y uso del producto, o durante las operaciones de carga y limpieza del equipo, enjuague de envases vacíos, etc. Evitar la deriva de la pulverización (Ver "Manejo de la Deriva").
Debe dejarse una franja sin aplicar (zona buffer) de al menos 5 metros de franja de seguridad entre áreas tratadas y cuerpos o cursos de agua).

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ORLIAN	CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL	37798	SC	10% + 10%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.